

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aspirin-C 400 mg/240 mg kihisevad tabletid atsetüülsalitsüülhape, askorbiinhape

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Aspirin-C ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Aspirin-C kasutamist
3. Kuidas ravimit Aspirin-C kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas ravimit Aspirin-C säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Aspirin-C ja milleks seda kasutatakse

Aspirin-C sisaldab atsetüülsalitsüülhapet, mis on valuvaigistava, palavikku alandava ja põletikuvastase toimega. Askorbiinhape (C-vitamiin) tõstab organismi vastupanuvõimet.

Aspirin-C tablette kasutatakse peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, lihas- ja liigesvalu ning palaviku korral, samuti külmetushaiguste või gripi puhul esineva valu ja palaviku korral.

2. Mida on vaja teada enne Aspirin-C kasutamist

Ravimit Aspirin-C ei tohi kasutada

- kui olete atsetüülsalitsüülhappe, askorbiinhappe, teiste salitsülaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on ägedad seedetrakti haavandid;
- kui teil on eelsoodumus veritsuste või verejooksude tekkele;
- kui teil esineb või on varem esinenud salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti mittesteroidsete põletikuvastaste ainete) poolt esile kutsutud astma;
- kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus;
- kui teil on või on kunagi olnud neerukivitõbe;
- kui teil on hüperoksaluuria (uriinis suurenenud oksalaatide sisaldus);
- kui teil on hemokromatoos (ainevahetushäire, mis avaldub raua ladestumises organismis);
- kui teile on määratud raviks metotreksaati annuses ≥ 15 mg nädalas;
- raseduse viimase kolmandiku ajal.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aspirin-C:

- kui olete ülitundlik valuvaigistavate, põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide suhtes;
- kui teil on või on varem olnud seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi või seedetrakti verejooks;
- kui teile on määratud vere hüübimisvastane ravi;

- kui teil on neeru või südame-veresoonkonna häired (nt renovaskulaarne haigus, kongestiivne südamepuudulikkus, hüповoleemia), teile on teostatud lõikus, esineb sepsist või verejookse;
- kui teil on ainevahetusehäire nimega glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus;
- kui teil on maksatalitluse häired;
- kui teil on kusi happe eritumise häired;
- kui te olete rase (raseduse esimene või teine kolmandik) või imetate last.

Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhappe kusi happe eritumist. See võib soodustada podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusi happe eritumise häired.

Atsetüülsalitsüülhappe võib vallandada bronhospasmi ja kutsuda esile astmahoooge või muid ülitundlikkusreaktsioone. Riskifaktoriteks on olemasolev bronhiaalastma, heinapalavik, ninapolüübid (adenoidid) või krooniline hingamisteede haigus.

Atsetüülsalitsüülhappe võib luua eelsoodumuse verejooksude tekkeks kirurgiliste operatsioonide ajal või nende järgselt (kaasa arvatud väiksemad kirurgilised protseduurid, nt hamba väljatõmbamine).

Atsetüülsalitsüülhappet ei ole soovitatav anda lastele ja alla 16-aastastele noorukitele palavikuga või ilma palavikuta kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye sündroom (eluohulik seisund, mida iseloomustab entsefalopaatia (kesknärvisüsteemi kahjustus), maksatalitluse häired, esmanähuna kauakestev oksendamine). Reye sündroom on väga harvaesinev, kuid võimalik, et eluohulik seisund, mis nõuab kohest meditsiinilist sekkumist.

Neerukivitõve eelsoodumusega või kroonilise neerukivitõvega patsientidel tuleb seoses askorbiinhappe manustamisega olla ettevaatlik.

Kuna ravimis sisalduv askorbiinhape (C-vitamiin) võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside tulemusi, siis juhul kui teile määratakse analüüse, informeerige oma arsti sellest, et kasutate ravimit Aspirin-C.

Muud ravimid ja Aspirin-C

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Aspirin-C tablette ei tohi võtta, kui te saate samal ajal ravi metotreksaadiga annuses 15 mg nädalas või rohkem.

Aspirin-C tablettidega samaaegsel kasutamisel võivad tugevneda järgmiste ravimite toimed ja kõrvaltoimed:

- metotreksaat (pahaloomuliste haiguste, psoriaasi ja reumatoidartriidi ravis kasutatav ravim);
- antikoagulandid (vere hüübimist pärssivad ravimid);
- mittesteroidsed põletikuvastased ained;
- selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (depressiooni ravis kasutatavad ravimid);
- digoksiin (südamepuudulikkuse ravim);
- insuliin ja sulfonüüluurea preparaadid (suhkurtõve ravis kasutatavad ravimid);
- valproehape (epilepsiaravim).

Glükokortikosteroidide (krooniliste ja ägedate põletike ravis kasutatavad hormoonravimid) samaaegsel kasutamisel väheneb salitsülaatide toime nende suurenenud eritumise tõttu.

Aspirin-C tablettidega samaaegsel kasutamisel võivad nõrgeneda järgmiste ravimite toimed:

- diureetikumid (kuseeritust suurendavad ravimid);
- angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (vererõhku alandavad ravimid);
- bensbromaroon, probenetsiid (kusi happe eritumist soodustavad ravimid).

Aspirin-C koos alkoholiga

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab veritsusaega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul võib Aspirin-C kihisevaid tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Aspirin-C tablette kasutada.

Kuna seni ei ole ravimi aeg-ajalt kasutamisel täheldatud ebasoodsat mõju imikule, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Seni avaldatud andmete kohaselt ei kahjusta atsetüülsalitsüülhappe inimese viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Aspirin-C ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Aspirin-C sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab 467 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes kihisevas tablettis. See on võrdne 23%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel.

3. Kuidas ravimit Aspirin-C kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Arstiga konsulteerimata ei tohi Aspirin-C tablette võtta kauem kui 3...5 päeva.

Täiskasvanud: soovitatav annus on 1...2 kihisevat tabletti ühekordse annusena, mida võib vajadusel korrata mitte varem kui 4 tunni järel. Maksimaalset ööpäevast annust 10 tabletti ei tohi ületada.

Enne manustamist tuleb tablett/tabletid lahustatada klaasitäies vees.

Lapsed: Aspirin-C kihisevaid tablette ei soovitata lastel kasutada (vt ka lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kui te võtate Aspirin-C tablette rohkem, kui ette nähtud

Atsetüülsalitsüülhappe

Atsetüülsalitsüülhappe üleannustamise korral võivad ilmned peapööritus, tinnitus (kohin kõrvades), kuulmislangus, higistamine, iiveldus, oksendamine, peavalu ja segasusseisund; hingamine võib muutuda kiireks ja/või sügavaks.

Raske mürgistuse korral võib tekkida hingeldus, hingamisseiskus, väga kõrge palavik, seedetrakti verejooks, südamerütmihäired, vererõhu langus, südameseiskumine, ajuverevarustuse äkilisest vähenemisest põhjustatud teadvusetus või kooma, võivad tekkida krambid.

Askorbiinhape (C-vitamiin)

C-vitamiini üleannustamise sümptomiteks võivad olla seedetrakti häired, nt kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine.

Üleannustamissümptomite ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral lõpetage ravimi kasutamine ja võtke viivitamatult ühendust arstiga. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate Aspirin-C tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esineda võib seedetrakti ärritusnähte nagu seedehäired, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, harva seedetrakti põletik ja -haavand, mis võib väga harva põhjustada seedetrakti haavandi verejooksu ja mulgustumist.

Pikaajalisel kasutamisel on võimalik membraanitaoliste ahenemiste teke soolestikus (diafragmataolised soolestriktuurid).

Suurenenud on verejooksuohut (kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt tekkiv verejooks, verevalumid, ninaverejooks, verejooks kuse- ja suguelunditest ning igemete veritsus). Harva ja väga harva on esinenud tõsiseid seedetrakti- ja ajuverejookse, mis võivad üksikjuhtudel olla ka eluohtlikud.

Verejooksust tingitult võib esineda aneemiat või rauavaegusaneemiat (kehvveresus), mille sümptomiteks on jõuetus ja kahvatus.

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi raske puudulikkusega patsientidel on teatatud hemolüüsi (vere punaliblede lagunemine) ja hemolüütilise aneemia (vere punaliblede lagunemise tagajärjel tekkinud kehvveresus) tekkest.

Teatatud on neerukahjustuse ja ägeda neerupuudulikkuse tekkest.

Ilmneda võivad ülitundlikkusreaktsioonid (nn aspiriinastma, lööve, nõgestõbi, turse, sügelus, nohu, ninakinnisus, südame löögisageduse või rütmi muutused, õhupuudus või hingamisraskused, väga harva anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, mille sümptomiteks on higistamine, iiveldus, naha või limaskestade sinakaspunane värvus, tugev vererõhu langus, teadvushäired, isegi kooma jne).

Väga harva on täheldatud maksafunktsiooni häireid.

Esinenud on peapööritust ja tinnitust (kohin/helin kõrvades), mis võib olla tingitud üleannustamisest.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ravimit Aspirin-C säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab sellele kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aspirin-C sisaldab

- Toimeained on atsetüülsalitsüülhape ja askorbiinhape. Üks tablett sisaldab 400 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 240 mg askorbiinhapet (C-vitamiin).

- Abiained on naatriumdivesiniktsitraat, naatriumvesinikkarbonaat, sidrunhape ja naatriumkarbonaat.

Kuidas Aspirin-C välja näeb ja pakendi sisu

10 tabletti paber/PE/alumiinium/Surlyn kotikestes.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

UAB Bayer
Sporto 18
LT-09238 Vilnius
Leedu

Tootja

Bayer Bitterfeld GmbH
Ortsteil Greppin
Salegaster Chaussee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 12, 11415 Tallinn
Tel: +372 655 8565
e-post: mi.baltic@bayer.com

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2020.