

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tavegyl, 1 mg tabletid Klemastiin

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Tavegyl tabletid ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Tavegyl tablettide võtmist
3. Kuidas Tavegyl tablette võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Tavegyl tablette säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Tavegyl tabletid ja milleks seda kasutatakse

Tavegyl sisaldab toimeainet klemastiini, mis on antihistamiinikum ja mida kasutatakse allergiliste sümptomite leevendamiseks. Tavegyl takistab histamiini toimet, mis on allergiliste reaktsioonide ajal organismis vabanev aine (ilmneb punetava lööbena, kudede tursena või raske sügelusena). Tavegyl tablette kasutatakse allergilise nohu (riniidi) sümptomaatiliseks raviks, nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiliseks raviks, sügelevate allergiliste mittepõletikuliste nahahaiguste (dermatooside) leevendamiseks.

Kui teil on küsimusi Tavegyl'i kohta, küsige oma arsti või apteekri käest.

2. Mida on vaja teada enne Tavegyl tablettide kasutamist

Ärge võtke Tavegyl'i

- kui te olete klemastiini, teiste antihistamiinsete ainete või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on porfüüria (ainevahetushäire)

Ärge andke Tavegyl'i alla 3-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

Öelge oma arstile või apteekrile kui mõni eespool loetletust kehtib teie kohta, kuna Tavegyl ei ole sel juhul teile sobilik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui teil on mõni järgnev haigus:

- epilepsia või on kunagi esinenud krampe
- glaukoom (silmasisese rõhu tõus),
- rasked maoprobleemid,
- eesnäärme häired,

- põiekaela sulgus

Kui mõni loetelust kehtib teie kohta, rääkige oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke Tavegyl'i rohkem kui soovitatud.

Eakatel võib selle ravimi kasutamisel esineda rohkem kõrvaltoimeid. Hooldajad peavad arvestama, et see ravim võib tekitada segasusseisundit eakatel.

Muud ravimid ja Tavegyl tabletid

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Pidage nõu arstiga kui te võtate ärevusevastaseid ravimeid, valuvaigisteid, tarbite alkoholi, võtate ravimeid, mida nimetatakse monoamiinioksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI) - neid kasutatakse depressiooni raviks.

Kui te võtate ravimied, mis tekitavad uimasust või suukuivust (neid nimetatakse vahel ka antikolinergilisteks ravimiteks), samal ajal kui te võtate Tavegyl'i, on oht kõrvaltoimete tekkeks suurem.

Tavegyl tabletid koos toidu ja joogiga

Nagu mitmed teisedki antihistamiinikumid, võib ka Tavegyl tugevdada alkoholi toimet. Alkoholi tarvitamist tuleb selle ravimi võtmise ajal vältida.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Tavegyl tablette ei tohi manustada raseduse, raseduse planeerimise ja rinnaga toitmise ajal.

Pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nagu teisedki antihistamiinikumid, võib Tavegyl alandada mõnedel inimestel tähelepanuvõimet. Kui te tunnete pearinglust või uimasust, ärge juhtige autot või töötage masinatega.

Tavegyl tabletid sisaldavad laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Tavegyl tablette võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tabletid tuleb sisse võtta koos veega enne sööki.

Täiskasvanud ja vanemad kui 12-aastased lapsed:

1 tablett 2 korda päevas, hommikul ja õhtul.

Ainult arsti loal tohib ravimit võtta 6 tabletti 24 tunni jooksul, mis on jagatud 3 manustamiskorra vahel. Suurim ühekordne annus on 2 tabletti korraga.

3 kuni 12-aastased lapsed:

Tablett manustada enne hommikusööki ja enne magamaminekut.

3...6 aastased lapsed: 0,5 mg (½ tabletti);

6...12 aastased lapsed 0,5...1 mg (½...1 tabletti).

Tavegyl'i ei tohi ilma arstiga konsulteerimata võtta kauem kui 14 päeva.

Manustamisviis

Suukaudne.

Tabletid tuleb sisse võtta koos veega enne sööki.

Mitte ületada soovitatud annust.

Kui te võtate ravimit rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamise või juhusliku allaneelamise korral võtke ühendust oma arsti, apteekri või kiirabiga.

Kui te unustate ravimit võtta

Võtke annus koheselt, kui see teile meenub, ning edaspidi jätkake ravimi kasutamist nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, et vahelejäänud annust korvata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Katkestage Tavegyl'i võtmine ja otsige koheselt arstiabi, kui teil tekib:

- tõsine allergiline reaktsioon
- hingeldus
- kiire südamerütm (südamepekslemine)

Need reaktsioonid esinevad harva.

Teised kõrvaltoimed:

Ravi Tavegyl'iga põhjustada väsimust ja uimasust.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

- pearinglus

Harva esinevad kõrvaltoimed:

- erutus, eriti lastel, hingamishäired, ülitundlikkusreaktsioone (sealhulgas šokki) (vt sümptomid üleval), suukuivus, peavalu, nahalööve, kõhuvalu, seedehäired.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed:

- tahhükardia (kiirenenud südamerütm).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Tavegyl tablette säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tavegyl sisaldab

- Toimeaine on klemastiin. Üks tablett sisaldab 1 mg klemastiini (1,34 mg klemastiinfumaraadina).
- Abiained on magneesiumstearaat, povidoon, talk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas Tavegyl välja näeb ja pakendi sisu

Valkjas, ümmargune, lame, kaldservadega katmata 7 mm läbimõõduga tablett, mille ühel pool poolitusjoon ja trükitud "OT". Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

PVC/PVDC blisterpakend alumiinium tagapõhjaga. Pakendis on 20 või 30 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Saksamaa

Tootja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraße 4
80339 München
Saksamaa

või

Smithkline Beecham, S.A.
Ctra.de Ajalvir, km. 2,500
Alcalá de Henares 28806
Madrid
Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB „STADA Baltics“
Goštauto 40A
03163 Vilnius
Leedu
e-post: ofisas@stada.lt

Infoleht on viimati koostöölstatud jaanuaris 2021.