

**Pakendi infoleht: teave patsiendile**  
**Fucidin 20 mg/g, salv**  
Fusidiinhape

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

**Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Fucidin salv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Fucidin salvi kasutamist
3. Kuidas Fucidin salvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Fucidin salvi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

**1. Mis ravim on Fucidin salv ja milleks seda kasutatakse**

Fucidin salv sisaldab fusidiinhapet, mis on tugeva antibakteriaalse toimega antibiootikum. Fusidiinhape toimib stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Stafülokokid, kaasa arvatud penitsilliin-resistentsed ja teiste antibiootikumide suhtes resistentsed tüved, on fusidiinhappe suhtes tundlikud.

Fucidin salvi kasutatakse fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahainfektsioonide raviks, nagu impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt infitseerunud dermatiit ja haavad.

**2. Mida on vaja teada enne Fucidin salvi kasutamist**

**Ärge kasutage Fucidin salvi**

- kui te olete ülitundlik (allergiline) Fucidin salvi mõne koostisosa suhtes.

**Hoiatused ja ettevaatusabinõud:**

Kui Fucidin salvi kasutatakse näol, tuleb hoiduda salvi silma sattumise eest, sest salvis sisalduvad ahiained võivad põhjustada konjunktivi ärritust. Fucidin salvis sisalduvad tsetüülalkohol ja lanoliin. Need ahiained võivad põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Fucidin salv sisaldab butüülhüdrosütolueeni (E321), mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

**Fertiilsus**

Puuduvad kliinilised andmed Fucidini paikse kasutamise mõjust fertiilsusele. Fertiilses eas naistel ei ole ravimi toime tõenäoline, kuna paiksest manustatud fusidiinhappe/naatriumfusidaadi süsteemne imendumine on ebaoluline.

**Rasedus**

Fucidin salvi võib kasutada raseduse ajal.

Toime lootele on ebatõenäoline, kuna fusidiinhappe/naatriumfusidaadi paikse kasutamise järgselt on süsteemne imendumine ebaoluline. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

### **Imetamine**

Fucidin salvi võib kasutada rinnaga toitmise ajal, kuid soovitatav on vältida Fucidin salvi kasutamist rinnal.

### **Muud ravimid ja Fucidin salv:**

Koostoimeuuringuid ei ole teostatud. Süsteemne koostoime on ebatõenäoline, sest pärast paikse Fucidini manustamist on süsteemne toime ebaolulise tähtsusega. Sellele vaatamata informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

## **3. Kuidas Fucidin salvi kasutada**

Fucidin salvi määratakse kahjustatud piirkonnale 2...3 korda päevas, üldiselt 7 päeva vältel. Salvi võib kasutada ilma katva sidemeta.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka Fucidin salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete sagedus baseerub kliiniliste uuringute ja spontaansete teatiste koondanalüüsi andmetel.

Tuginedes Fucidin kreemi ja Fucidin salvi kombineeritud kliinilistele andmetele, mis hõlmas 4724 patsienti, võivad ligikaudu 2,3 % patsientidest tekkida kõrvaltoimed.

Fucidin salv on üldjuhul hästi talutav ja ülitundlikkusreaktsioonid tekivad väga harva.

**Harvad kõrvaltoimed** (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st): ülitundlikku mis tahes ravimi koostisosa suhtes, konjunktiviit, angioödeem (turse), urtikaaria (nõgestõbi), villid.

**Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed** (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): dermatiit, lööve, pruuritus (sügelus), erüteem (punetus).

### Lapsed

Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja tõsidusaste lastel on sarnane täiskasvanutega.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Fucidin salvi säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 90 päeva.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Fucidin salv sisaldab:**

- **Toimeaine on** fusidiinhape. Salvi 1 g sisaldab 20 mg naatriumfusidaati.
- **Abiained on** lanoliin, tsetüülalkohol, all-*rac*-alfa-tokoferool, butüülhüdrosütolueen (E321), vedel parafiin ja valge pehme parafiin.

### **Müügiloa hoidja**

LEO Pharma A/S  
Industriparken 55  
DK-2750 Ballerup  
Taani

### **Tootjad**

LEO Laboratories Ltd  
285 Cashel Road, Dublin 12  
Iirimaa

Leo Pharma Manufacturing Italy S.r.l.  
Via E.Schering 21  
20054 Segrate (MI)  
Itaalia

**Infoleht on viimati uuendatud novembris 2022.**