

Pakendi infoleht: teave kasutajale

STREPSILS VITAMIN C, losengid (imemistabletid)

amüülmetakresool, 2,4-diklorobensüülalkohol, vitamiin C

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Strepsils Vitamin C ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Strepsils Vitamin C kasutamist
3. Kuidas Strepsils Vitamin C kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Strepsils Vitamin C säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Strepsils Vitamin C ja milleks seda kasutatakse

Strepsils Vitamin C imemistabletid sisaldavad kahe antiseptilise toimeaine kombinatsiooni, mis toimib suu- ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele. Strepsils Vitamin C imemistablette kasutatakse desinfitseeriva vahendina suu- ja neelupõletike korral patsientidel, kes samaaegselt vajavad täiendavalt C-vitamiini. Askorbiinhape on C-vitamiini allikas, mille sisaldus arvatakse infektsioonide ajal langevat.

2. Mida on vaja teada enne Strepsils Vitamin C kasutamist

Strepsils Vitamin C ei tohi kasutada

- kui olete toimeaine(te) või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Lapsed

See ravim on vastunäidustatud alla 6-aastastele lastele.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Amüülmetakresooli ja 2,4-diklorobensüülalkoholi kasutamise kohta andmed puuduvad või on piiratud.

Nagu kõigi ravimite puhul, tuleb ettevaatlik olla ka selle ravimi kasutamisel raseduse ajal ning vajadusel pidada nõu arstiga.

Imetamine

Ei ole teada kas 2,4-diklorobensüülalkohol ja amüülmetakresool või nende metaboliidid erituvad rinnapiima. Ohtu vastsündinule/imikule ei saa välistada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Viljakus

Toime kohta viljakusele andmed puuduvad.

Strepsils Vitamin C sisaldab gluteeni, propüleenglükooli, naatriumi, allergeenidega lõhnaaineid, glükoosi, sahharoosi, sulfiteid, asovärvaineid

Selle ravimi gluteenisaldus on väga madal (pärineb nisutärklisest). Seda peetakse „gluteenivabaks” ja on väga väge tõenäoline, et see põhjustab probleeme tsöliaakiahaigetel. Üks loseng sisaldab mitte rohkem kui 19,36 mikrogrammi gluteeni.

Kui teil on nisuallergia (erinev tsöliaakiast), ärge seda ravimit kasutage.

Ravim sisaldab 3 mg propüleenglükooli ühes losengis.

Ravim sisaldab 69,9 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) maksimaalses ööpäevases annuses (8 tabletti). See on võrdne 3,5%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel.

Ravim sisaldab tsitraali, tsitronellooli, d-limoneeni, geraniooli ja linalooliga lõhnaaineid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Sisaldab 0,97 g glükoosi ja 1,44 g sahharoosi ühes losengis. Sellega tuleb arvestada suhkurtõbe põdevatel patsientidel.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Vääveldioksiid võib harva tekitada raskeid ülitundlikkusreaktsioone ja bronhospasmi.

Asovärvained (päikeseloojangukollane (E110), Ponceau 4R punane (E124)) võivad tekitada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas Strepsils Vitamin C kasutada

Sümptomite leevendamiseks kasutada minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

Täiskasvanud: 1 imemistablett lasta suus aeglaselt sulada iga 2 kuni 3 tunni järel, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas.

Lapsed

Üle 6-aastased lapsed: nagu eelpool täiskasvanud.

Alla 6-aastased lapsed: ei sobi alla 6 aasta vanustele lastele.

Eakad: nagu eelpool täiskasvanud.

Ärge ületage lubatud annust.

Kui te võtate Strepsils Vitamin C` rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamisel võivad tekkida seedetrakti vaevused.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume:

Väga sage: tekib rohkem kui ühel kasutajal 10st

Sage: tekib 1...10 kasutajal 100st

Aeg-ajalt: tekib 1...10 kasutajal 1000st

Harv: tekib 1...10 kasutajal 10 000st

Väga harv: tekib vähem kui ühel kasutajal 10 000st

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Immuunsüsteemi häired:

Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid (võivad tekkida lööbe, angioödeemi, nõgestõbi, bronhospasmi ja minestusega hüpertensiooni kujul)

Seedetrakti häired:

Teadmata: kõhuvalu, iiveldus, ebamugavustunne suus (võib tekkida kurguärrituse, suuõõne paresteesia, suu turse ja keelevalu kujul)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Teadmata: lööve

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Strepsils Vitamin C säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Strepsils Vitamin C sisaldab

- Toimeained on amüülmetakresool ja 2,4-diklorobensüülalkohol ja vitamiin C. Üks imemistablett sisaldab 0,6 mg amüülmetakresooli ja 1,2 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi ja 100 mg vitamiini C (askorbiinhapet).

- Abiained on levomentool, veriapelsini maitseaine, viinhape, propüleenglükool, värvaine päikeseloojangukollane (E110), värvaine Ponceau 4R punane (E124), vedel sahharoos, vedel glükoos.

Kuidas Strepsils Vitamin C välja näeb ja pakendi sisu

Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.

Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.

Loseng (imemistablett) on ringikujuline, apelsini värvuse ja maitsega (läbimõõt 1,8 cm)

Müügiloa hoidja

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola

Tootjad

RB NL Brands B.V.
Schiphol Boulevard 207
1118 BH Schiphol
Holland

SIA ELVIM
Kurzemes prospekts 3-513
RIGA LV-1067
Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Kärberi 34-30
Tallinn 13919
Tel: 5151555

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2022.