

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Visine Classic 0,5 mg/ml silmatilgad Tetrüsoliinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
- Kui pärast 2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Visine Classic ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne ravimi Visine Classic kasutamist
3. Kuidas ravimit Visine Classic kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas ravimit Visine Classic säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Visine Classic ja milleks seda kasutatakse

Ajutine leevendus mitte-infektsioosse silmärritusega patsientidele konjunktiviiturse ja silmapunetuse korral, mis on tingitud näiteks tuulest, suitsust või kloreeritud veest.

2. Mida on vaja teada enne ravimi Visine Classic kasutamist

Ravimit Visine Classic ei tohi kasutada

- kui olete tetrüsoliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on suletudnurga glaukoom
- alla 3-aastastel lastel

3...5-aastastel lastel tohib ravimit Visine Classic kasutada ainult arsti ettekirjutusel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravimi Visine Classic kasutamist pidage nõu oma arstiga

- kui te põete tõsist südame-veresoonkonna haigust (nt südame isheemiatõbi, kõrgvererõhutõbi, feokromotsütoom)
- kui teil on eesnäärme healoomuline suurenemine
- kui te kasutate monoamino oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (teatud depressiooniravimid) või teisi potentsiaalselt vererõhku tõstvaid ravimeid
- kui te põete endokriinsüsteemi haigusi (hüpertüreos, suhkurtõbi, porfüüria)
- kui teil on ninalimaskesta kuiv põletik
- kui teil on kuiv sarvkesta-sidekestapõletik
- kui teil on avatudnurga glaukoom

Silmaravimite pikaajaline kasutamine ja üleannustamine võib põhjustada silma sidekesta liigveresust ja ninalimaskesta reaktiivset liigveresust (*Rhinitis medicamentosa*).

Ravimi kasutamine võib põhjustada mööduvat müdriaasi (pupilli laienemine).

Märkus kontaktläätsede kasutajatele

Enamasti tuleb silmahaiguse korral kontaktläätsed silmast eemaldada. Erandjuhul võib kanda nn kõvasid kontaktläätsi, kuid ka need kontaktläätsed tuleb enne ravimi Visine Classic kasutamist silmadest eemaldada. Kontaktläätsed võib silma tagasi asetada 15 minuti möödumisel pärast ravimi kasutamist.

Muud ravimid ja Visine Classic

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Tetrüsoliini ja MAO inhibiitorite ning tritsükliliste antidepressantide kooskasutamine võib põhjustada vasokonstriksiooni tõttu vererõhu tõusu.

Rasedus ja imetamine

Ravimit Visine Classic ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Harvadel juhtudel võib nägemise hägusus või müdriaas põhjustada halvenenud võimet töötada mehhanismidega ja juhtida sõidukit. Patsient peaks veenduma, kuidas ravim talle toimib, enne kui alustab nimetatud tegevusi.

Visine Classic sisaldab bensalkooniumkloriidi ja boori

Ravimi sisaldab 0,1 mg bensalkooniumkloriidi ühes ml lahuses. Bensalkooniumkloriid võib absorbeeruda pehmetesse kontaktläätsedesse ja muuta nende värvust. Eemaldage kontaktläätsed enne ravimi manustamist ja pange tagasi 15 minutit pärast manustamist. Bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust, eriti kui teil on kuivsilmsus või sarvkesta (silma eesmine läbipaistev osa) kahjustus. Kui tunnete ravimi kasutamise järgselt silmas ebamugavust, kipitust või valu, konsulteerige arstiga.

Ravimi maksimaalne ööpäevane annus sisaldab 1,363 mg boori.

3. Kuidas ravimit Visine Classic kasutada

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed

1...2 tilka haigesse silma 2...3 korda ööpäevas. Ravi võib jätkata vajadusel kuni 2 päeva.

Ravimi Visine Classic kasutamine on vajalik lõpetada ja arsti poole pöörduda, kui silmaärritus või -punetus 48 tunni jooksul ei möödu või hoopis süveneb ning kui on tekkinud silmavalu või nägemismuutus. Arsti kiire konsultatsioon on hädavajalik, kui silmapunetus või -ärritus on põhjustatud silma ohtlikust seisundist nagu infektsioon, võõrkeha silmas või keemiline korneaaltrauma. Arsti kiire konsultatsioon on vajalik ka juhul, kui tekib tõsine äge või ühepoolne silmapunetus, tugev silmavalu ja peavalu, nägemise halvenemine, topelnägemine või "ujuvad laigud silme ees".

3...5-aastased lapsed

Kasutada ainult arsti ettekirjutuse järgi.

Alla 12-aastastele lastele on soovitatav seda ravimit manustada lapsevanema abiga.

Ravimi saastumise vältimiseks mitte puudutada tilguti otsa.

Pärast kasutamist asetage pudelile kork.

Kui te kasutate ravimit Visine Classic, rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral imendub ravimi Visine Classic toimeaine vereringesse, mis võib põhjustada üldiste kõrvaltoimete esinemist. Palun pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage ($\geq 1/100$ kuni $< 1/10$): reaktiivne silmapunetus, limaskesta põletustunne, limaskesta kuivus

Aeg-ajalt ($\geq 1/1000$ kuni $< 1/100$): üldised toimed (nt südamepekslemine, peavalu, värisemine, nõrkus, higistamine ja vererõhu tõus), südame rütmihäired, kiirenenud pulss, kiirenenud ebakorrapärane südamerütm, reaktiivne südamerütmi aeglustumine

Harv ($\geq 1/10\ 000$ kuni $< 1/1000$): nägemise hägusus, silma sidekesta ärritus

Väga harv ($\geq 1/10\ 000$ kuni $< 1/1000$; k.a teadmata sagedusega juhud): silma sidekesta pealmise rakukihi sarvestumine koos pisarakanali sulguse ja pisaravooluga, müdriaas (pupilli laienemine), manustamiskoha reaktsioonid (sh silma või silmaümbruse põletustunne, nahapunetus, ärritustunne, turse, valu ja sügelemine)

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ravimit Visine Classic säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Pärast pudeli esmakordset avamist kasutage ravim 28 päeva jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate muutunud värvust või hägusust.

Vältida kokkupuudet kontaktläätsedega (vt lõik 2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Visine Classic sisaldab

- Toimeaine on tetrüsoliin. 1 ml sisaldab 0,5 mg tetrüsoliinvesinikkloriidi.
- Teised abiained on bensalkooniumkloriid, naatriumkloriid, boorhape, booraks, dinaatriumedetaat, puhastatud vesi.

Kuidas Visine Classic välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu lahus.

15 ml mahuga väikese tihedusega polüetüleenpudel (LDPE) väikese tihedusega (LDPE) polüetüleentilgutiga, millel on sisemise keermega polüpropüleenkork või lapsekindel kork, mille sisemine osa on polüpropüleenist ning välimine osa kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE).

Sisaldab: 15 ml lahust.
Pakendis 1 pudel.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght
Dublin 24
Iirimaa

Tootja

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Belgia

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2020.