

Pakendi infoleht: teave kasutajale
FLUDITEC, 20 mg/ml siirup
Karbotsüsteiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Fluditec ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Fluditec'i võtmist
3. Kuidas Fluditec'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Fluditec'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Fluditec ja milleks seda kasutatakse

See ravim muudab röga vähem kleepuvaks ning seejärel on seda lihtsam välja köhida.

Ravimit soovitatakse kasutada bronhide ahenemise, eriti ägeda bronhiidi korral lastel, alates 2 eluaastast.

2. Mida on vaja teada enne Fluditec'i võtmist

Fluditec'i ei tohi võtta

- kui teie laps on karbotsüsteiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (eriti metüülparahüdroksübensoaadi või teiste parahüdroksübensoaadi soolade), loetletud lõigus 6, suhtes allergiline (ülitundlik);
- kui teie laps on alla 2-aastane, sest esineb risk bronhiturse ägenemiseks.

Kahtluse korral pidage nõu arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fluditec'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Peate pöörduma arsti poole esmaabi saamiseks:

- produktiivse köha korral, millega kaasub mädane eritis ja palavik,
- kui teie lapsel on kopsutorude või kopsude krooniline (pikaajaline) haigus,
- mao- või kaksteistsõrmiku haavand,
- seedetrakti verejooksu põhjustavate ravimite samaaegne kasutamine. Mao või soolte verejooksu korral on soovitatav ravi katkestada.

Selle ravimi kasutamisega peavadks alati kaasnema vabatahtlikud pingutused röga välja köhimiseks. Sümptomite süvenemise korral ei tohiks ravi jätkata. Sellistel juhtudel konsulteerige oma arstiga ravi uuekssti hindamiseks.

Kui teil on kahtlusi või küsimusi, küsige oma arsti või apteekri käest.

Muud ravimid ja Fluditec

Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie laps võtab või on hiljuti võtnud või kavatsseb võtta mis tahes muid ravimeid.

Fluditec'i ei tohi kasutada koos kõharefleksi pärssivate ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Seda ravimit tohib kasutada raseduse ajal ainult juhul, kui arst on seda teile soovitanud.

Ravimi kasutamise ajal tohib last imetada.

Enne mistahes ravimi kasutamist küsi nõu oma arstilt või apteekrilt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fluditec ei oma teadaolevalt toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Fluditec sisaldab sahharoosi, naatriumi, metüülparahüdroksübensoaati (E218), päikeseloojangukollast FCF (E110).

See ravim sisaldab 3,5 g sukroosi (suhkur) 5 ml-s. Sellega peavad arvestama diabeediga patsiendid ja madala suhkrisaldusega dieedil olevad isikud. Kui arst on teile öelnud, et teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes 5 ml annuses, seega on praktiliselt naatriumivaba.

Ravim sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja aso-värvainet (päikeseloojangukollane FCF (E110)). Need võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalik, et hilistüüpi reaktsioone).

3. Kuidas Fluditec'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annus

Üks 5ml-ni täidetud mõõtkork sisaldab 100 mg karbotsüsteiini.

- Üle 5-astased lapsed: 300 mg ööpäevas jagatuna 3 annuseks või 5 ml-ni täidetud mõõtkorgitais 3 korda päevas.

- 2...5-aastased lapsed: 200 mg ööpäevas jagatuna 2 annuseks või 5 ml-ni täidetud mõõtkorgitais 2 korda päevas.

Kui teil on tunne, et selleravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis

Suukaudne.

Pärast kasutamist loputage mõõtkork. Pärast kasutamist sulgege pudel uuesti.

Ravi kestus

Ravi ei tohi kesta kauem kui 8 kuni 10 kui arst ei ole teid teisiti juhendanud.

.

Kui te võtate Fluditec'i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate Fluditec'i kasutada

Ärge andke lapsele kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

- Bronhide ahenemise süvenemine imikutel.
- Võivad tekkida seedetrakti häired (nt kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus). Kui need kõrvaltoimed ilmnevad, on soovitatav annust vähendada.
- Võimalik on mao või soolte verejooks. Ravi tuleb lõpetada.
- Allergilised nahareaktsioonid, nt sügelus, lööve nahal esinevate laikude või vistrikena, nõgestõbi, näo ja / või kaela turse, mis võib põhjustada hingamisraskusi ja patsienti ohustada (Quincke ödeem). Sel juhul peate ravi katkestama ja viivitamatult arstiga nõu pidama.
- Pruuni- või lillakanaastuline nahakahjustus, mis võib nahale värvilaigu jätta (fikseeritud pigmentoosne erüteem). Sellisel juhul peate viivitamatult arstiga nõu pidama.
- Villiline lööve, kus nahal on villid, mis võivad esineda ka suus (mitmekujuline erüteem), villide lõhkemine koos naha irdumisega, mis võib laieneda kogu kehale ja ohustada patsienti (Stevensi-Johnsoni sündroom).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Fluditec'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoidke seda ravimit temperatuuril kuni 25°C.

Kõlblikkusaeg pärast esimest avamist: 2 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fluditec sisaldab:

Toimeaine on karbotsüsteiin. Üks ml siirupit sisaldab 20 mg (2%) karbotsüsteiini.

- Abiained on:

Sukroos, banaani lõhna- ja maitseaine*, metüülparahüdroksübensoaat (E218), glütserool, naatriumhüdroksiid, päikeseloojangukollane FCF(E110), puhastatud vesi.

*Banaani lõhna- ja maitseaine koostis: atsetaldehüüd, bensüülatsetaat, trans-heks-2-enüülatsetaat, heksüülatsetaat, isomüülatsetaat, isobutüülatsetaat, atsetoiin, atsetüülhape, isovaleerhape, 2-metüülbutüürhape, amüülalkohol, isopropanool, isoamüülalkohol, fenüületanool, propioonaldehüüd, n-butanool, butüüraldehüüd, butüüübutüraat, amüül/isomüülbutüraat, etüülbutüraat, isoamüülbutüraat, isobutüülbutüraat, metüülsinnaat, eugenool, butüülformiaat, trans-hekseen-2-al, cis-3-heksenool, 4-hüdroksü-2,5-dimetüül-3(2H)-furanon, PG, linalüülisobutüraat, isoamüülisovaleraat, 2-oktanool, isobutüülpropionaat, propüleenglükool, vaniliin.

Kuidas Fluditec välja näeb ja pakendi sisu

Selge, kollakas-oranž banaani lõhnaline vedelik.

Siirup 125 ml klaaspudelil 20 ml polüpropüleenist mõõtetopsiga.

Müügiloa hoidja

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL
22, avenue Aristide Briand
94 110 ARCUEIL
Prantsusmaa

Tootja

Innothera Chouzy
Rue Rene Chantereau
Chouzy-sur-Cisse
41150 Valloire-sur-Cisse
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole :

OÜ Retlando
Aisa 8
80017 Pärnu
Tel. +372 5136092

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2022.