

Pakendi infoleht: teave kasutajale
Canifug Cremolum, 100 mg + 10mg/g, vaginaalsuposiidid + kreem
Klotrimasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Canifug Cremolum ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Canifug Cremolum kasutamist
3. Kuidas Canifug Cremolum kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Canifug Cremolum säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Canifug Cremolum ja milleks seda kasutatakse

Klotrimasool on laia toimespektriga seentevastase toimega aine.

Canifug Cremolum kasutatakse pärmseente (peamiselt *Candida Albicans*) poolt põhjustatud tupepõletiku (vaginiit) ja häbemepõletiku (vulviit) raviks.

2. Mida on vaja teada enne Canifug Cremolum kasutamist

Ärge kasutage Canifug Cremolum

- kui olete klotrimasooli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- kui te kasutate deodorante või intiimhügieenitooteid. Ravi ajal võite kasutada deodoranti või intiimhügieenitooteid ainult pärast arstiga konsulteerimist, kuna see võib nõrgendada Canifug Cremolum toimet.
- Kui teie partneril on diagnoositud eesnaha või peenisepäe põletik, mis on põhjustatud seeninfektsioonist. Sellisel juhul tuleb kasutada täiendavat paikset ravi sobivas ravimvormis ravimiga.
- Kuna tupe punetus, kipitus, sügelus, voolus ning valulik põletik võib olla ka põhjustatud mikroorganismidest, millele Canifug Cremolum ei toimi, siis saab vaid arst anda täpse diagnoosi.
- Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.
- kui kasutate samaaegselt Canifug Cremolum ja latekstooteid (nt kondoomid, pessaarid). Nendes sisalduvate koostisainete tõttu (täpsemalt stearaadid) võib nende toodete toime ja seetõttu ka nende usaldusvärsus väheneda.

Lapsed

Vaginaalsuposiitide kasutamise kogemus lastel on piiratud. Ärge kasutage vaginaalsuposiite lastel arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Muud ravimid ja Canifug Cremolum

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Toimeaine klotrimasool vähendab amfoteritsiini ja teiste polüeenstruktuuriga antibiootikumide (nüstatiin, natamütsiin) toimet.

Canifug Cremolum koos toidu, joogi ja alkoholiga

Puuduvad andmed kõrvaltoimete kohta.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja imetamise ajal võite kasutada ravimit Canifug Cremolum, kuid üksnes arsti ettekirjutusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ettevaatusabinõud pole vajalikud.

Canifug Cremolum kreem sisaldab bensüülalkoholi

Kreem sisaldab 20 mg bensüülalkoholi ühes grammis (mis vastab ligikaudu 8 mg-le bensüülalkoholile kasutuskorra kohta). Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone ja kergelt paikset ärritust.

Canifug Cremolum kreem ja vaginaalsuposiidid sisaldavad tsetostearüülalkoholi

Tsetostearüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Ülitundlikel patsientidel soovitatakse kasutada ravimeid, mis ei sisalda tsetostearüülalkoholi.

3. Kuidas Canifug Cremolum kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Soovitav annus on:

Vaginaalsuposiidid

Kuuel järjestikusel päeval sisestage kord päevas üks vaginaalsuposiit (=100 mg klotrimasooli) nii sügavale tuppe kui võimalik.

Kreem

Lisaks tuleb 1...2 nädala jooksul kaks korda päevas haigestunud alale, häbemest päarakupiirkonnani, määrada õhukese kihina kreemi ja sisse hõõruda.

Manustamisviis

Vaginaalsuposiit on tupesiseseks kasutamiseks ja kreem suguelundite piirkonnas nahale määrimiseks.


Vaginaalsuposiidid

Sisestage kord päevas õhtuti peale käte pesemist üks vaginaalsuposiit sõrmega nii sügavale tuppe kui võimalik.

Eelistatult tuleks vaginaalsuposiit paigaldada selili asendis kergelt painutatud jalgadega.

Ravi pole otstarbekas läbi viia menstruatsiooni ajal, st. ravi tuleb lõpetada enne menstruatsiooni algust.

Vaginaalsuposiidi pakendist eemaldamiseks tõmmake tipust lahti fooliumikihid nagu on näidatud pildil.



Et ära hoida plekkide teket pesule tuleks peale vaginaalsuposiidi sisestamist kasutada pesukaitset.

Kreem

Lisaks tuleb 1-2 nädala jooksul kaks korda päevas haigestunud alale, häbemest pärakupiirkonnani, määrada õhukese kihina kreemi ja sisse hõõruda.

Kasutamise kestus

Üldiselt piisab vaginaalsuposiitide 6-päevasest ja kreemi 1-2-nädalasest kasutamisest. Ravimit tuleks kasutada niikaua isegi juhul kui tunnete end juba paremini.

Kui te kasutate Canifug Cremolum rohkem kui ette nähtud

Jätkake ravi tavapärase annusega.

Kui te unustate Canifug Cremolum kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust. Jätkake ravi ettenähtud annusega.

Kui te lõpetate Canifug Cremolum kasutamise

Palun rääkige oma arsti või apteekriga peale ravi lõpetamist, kuna ravi õnnestumine ei pruugi olla tõenäoline.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulised kõrvaltoimed: Ülitundlikkuse korral klotrimasooli, bensüülalkoholi, tsetostearüülalkoholi või mõne teise koostisaine vastu võivad tekkida allergilised reaktsioonid.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): Üksikjuhtudel on esinenud erineva raskusastmega generaliseerunud (üldised) ülitundlikkusreaktsioonid nahal (nt sügelus, punetus), hingamisteedes (nt hingeldushoog), vereringes (nt ravi vajav vererõhulangus kuni teadvushäireteni) ja seedetraktis (nt iiveldus, kõhulahtisus).

Teised võimalikud kõrvaltoimed

Aeg-ajalt ($\geq 1/1000$ kuni $< 1/100$) võib esineda nahaärritus – põletus- ja kipitustunne või ajutine punetus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Canifug Cremolum säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud fooliumil, tuubil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C (soojemal temperatuuril võivad suposiidid hakata sulama).

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Canifug Cremolum sisaldab

- Toimeaine on klotrimasool
Üks vaginaalsuposiit sisaldab 100 mg klotrimasooli.
Üks gramm kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli.
- Teised koostisosad on:
Vaginaalsuposiidid: tsetostearüülalkohol, tahke rasv, makrogool-20-glütseroolstearaat, poliüakrüülhappe naatriumisool.
Kreem: bensüülalkohol, tsetüülpalmiit, tsetostearüülalkohol, naatriumtsitraatdihüdraat, oktüüldodekanool, polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat, puhastatud vesi.

Kuidas Canifug Cremolum välja näeb ja pakendi sisu

Canifug Cremolum koosneb valgetest piklikest vaginaalsuposiitidest fooliumist ribapakendis ning valgest homogeensest kreemist tuubis, mis on omakorda asetatud karpis.

Kombineeritud pakend sisaldab 6 vaginaalsuposiiti vaginaalseks kasutamiseks ning 20 g kreemi kutaaneks (nahale) kasutamiseks väliste suguelundite piirkonnas.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56,
33611 Bielefeld,
SAKSAMAA
Tel: +49 (0) 521 8808 05
E-post: aw-info@drwolffgroup.com

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Sirowa Tallinn,
Salve 2c,
11612 Tallinn
Tel: 6 830 700

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2019.