

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Fortrans, suukaudse lahuse pulber kotikeses

Toimeaine: makrogool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik, milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Fortrans ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Fortransi kasutamist
3. Kuidas Fortransi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Fortrans'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Fortrans ja milleks seda kasutatakse

Fortrans'i kasutatakse täiskasvanutel soolestiku ettevalmistamiseks enne puhastatud soolestikku nõudvaid kliinilisi protseduure (nt seedetrakti uuringud või kirurgiline operatsioon).

2. Mida on vaja teada enne Fortransi kasutamist

Fortransi ei tohi kasutada

- kui te olete toimeaine makrogool või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on raske üldseisund, näiteks organismi suur vedelikupuudus (dehüdratsioon) ja raske südamepuudulikkus;
- kui teil on mõni allolev mao-või soolehaiguse probleem:
 - kaugelearenenud jämesoole kartsinoom;
 - raske ägedas faasis soolepõletik sealhulgas Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit;
 - soole mulgustus või selle kahtlus;
 - toksiline koliit või toksiline megakoolon;
 - soolesulgus;
 - sooleummistus või soole ahenemine
 - mao tühjendamise häired (nagu gastroparees).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Fortransi ei soovitata patsientidele, kellel esineb allergiat makrogooli (polüetüleenglükooli) suhtes.

Kui teil tekib soolestiku ettevalmistamiseks Fortrans'i kasutamisel äkiline kõhuvalu või verejooks pärasoolest, võtke nõu saamiseks kohe ühendust oma arstiga.

Enne Fortrans'i manustamist rääkige oma arstile, kui:

- teil on südamehaigus
- teil on neeruhaigus
- teil on neelamisraskused

Kui teid ohustab soolade sisalduse muutus organismis (elektrolüütide tasakaalu häired), võib teie arst otsustada teid eriliselt jälgida enne ja pärast loputusprotseduuri.
Kui te olete nõrga tervisega võib teie arst otsustada manustada teile Fortrans'i arstliku järelevalve all.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui te olete eakas tervisehäiretega patsient.

Lapsed ja noorukid

Fortrans'i ei kasutata alla 18-aastastel patsientidel. Ravimi kasutamise ohutus ja efektiivsus ei ole selle patsientide rühma osas veel kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja Fortrans

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

On tõenäoline, et Fortrans'i kasutamise ajal võib ajutiselt väheneda teiste ravimite, nt digoksiini, epilepsiavastaste ravimite, teatud verevedeldajate (kumariinid) ja immunosupressantide imendumine, mille tulemusel võib väheneda nende efektiivsus.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Fortrans sisaldab sahharinnaatriumi.

Ravim sisaldab 2,890 g naatriumi ühes kotikeses. Seda tuleb arvesse võtta madala naatriumisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

3. Kuidas Fortransi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Fortrans on suukaudselt manustatav ravim täiskasvanutele.

Soovitav annus on 1 liiter 15...20 kg kehakaalu kohta, mis keskmiselt vastab 3...4 liitrile (3...4 kotikest) lahusele.

Ravimit on võimalik manustada kas ühe annusena (3...4 liitrit õhtul enne protseduuri, pärast 2 liitri lahuse manustamist tuleb teha 1 tunni pikkune paus) või jagatuna kaheks annuseks (2 liitrit õhtul enne protseduuri ja 1...2 liitrit protseduuri hommikul või 3 liitrit õhtul enne protseduuri ja 1 liiter protseduuri hommikul).

Üks kotike lahustatakse 1 liitris joogivees. Loksutada, kuni pulber on täielikult lahustunud. Lahus on mõeldud kohe kasutamiseks. Vastavalt arsti juhistele peate te jooma 250 ml lahust iga 10...15 minuti järel.

Viimane lahuse kogus peab olema manustatud vähemalt 3...4 tundi enne uuringu või protseduuri algust.

Kui te võtate Fortrans'i rohkem, kui ette nähtud

- Kui te arvate, et olete võtnud liiga palju Fortrans'i, rääkige sellest oma arstile ja jooge piisavas koguses vett või selgeid vedelikke, et vältida organismi veepuuduse tekkimist.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pärast selle ravimi võtmist tekib teil sagedane kõhulahtisus. See on normaalne ja näitab, et ravim toimib. Olge tualettruumi läheduses kuni ravimi toimimine on lõppenud.

Selle ravimi kasutamisel võivad ilmneda alljärgnevad kõrvaltoimed:

Lõpetage Fortrans'i võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole, kui te märkate mõnda allpool kirjeldatud toimet:

- Allergiline nahareaktsioon – sümptomid võivad olla nahalööve või sügelev nahk, pundumine (lööve, nõgestõbi) või sügelus.
- Tõsine allergiline reaktsioon, mis võib põhjustada näo või kõri turset (angioödeem) või hingamisraskusi või peapööritust (anafülaksia).

Teised kõrvaltoimed võivad olla:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

- iiveldus
- kõhupuhitus või kõhuvalu

Sage (võib esineda 1 inimesel 10-st)

- oksendamine

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Fortransi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Fortransi pärast kõlblikusaega, mis on märgitud karbil (kuupäev PP.KK.AAAA).

Kõlblikusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fortrans sisaldab

- Toimeaine on makrogool.
- Teised koostisosad on veevaba naatriumsulfaat, naatriumbikarbonaat, naatriumkloriid, kaaliumkloriid.
- Abiaine on sahhariinnaatrium.

Kuidas Fortrans välja näeb ja pakendi sisu

Fortransi pakend on karp, karbis on 4 kotikest.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Ipsen Consumer Healthcare
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne - Billancourt

Cedex, Prantsusmaa

Tootja:

BEAUFOR IPSEN Industrie
28100 Dreux, Prantsusmaa.

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2021.