

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Otrivin, 1 mg/ml ninasprei, lahus** ksülometasoliinvesinikkloriid

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Otrivin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Otrivin'i kasutamist
3. Kuidas Otrivin'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Otrivin'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Otrivin ja milleks seda kasutatakse**

Otrivin 1 mg/ml on mõeldud ninakinnisuse leevendamiseks. See on kasutamiseks täiskasvanutele ja üle 12-aastastele noorukitele.

Otrivin sisaldab toimeainet ksülometasoliini. See avab kiiresti kinnise nina ja aitab eemaldada liigse lima ning võimaldab vabamalt hingata. Otrivin'i kasutatakse ninakinnisuse leevendamiseks nohu korral.

Otrivin'i toime tekib 2 minuti jooksul ja püsib kuni 12 tundi. Ravim on hästi talutav, seda ka tundliku ninalimaskestaga patsientidele.

Teie arst võib Otrivin'i soovitada ka teistel näidustustel.

Laborianalüüsid on näidanud, et ksülometasoliin vähendab külmetusega seotud rinoviiruste aktiivsust.

Otrivin sisaldab lisaks pehmendavaid aineid, mis aitavad ära hoida nina limaskesta kuivuse ja ärritusnähtude tekke.

#### **2. Mida on vaja teada enne Otrivin'i kasutamist**

##### **Otrivin'i ei tohi kasutada**

- kui te olete ksülometasoliini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline,
- kui te olete hiljuti läbi teinud operatsiooni, mis teostati nina kaudu (ajuoperatsioon, mis teostati nina või suu kaudu),
- kitsanurga glaukoom,
- esineb krooniline nina põletik ja kuiv ninaõõs (*Rhinitis sicca* või atroofiline riniit).

Kui eelpool nimetatud kehtib teie kohta, siis teavitage sellest oma arsti, kuna nendel juhtudel ei sobi Otrivin teile kasutamiseks.

## **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Otrivin'i kasutamist rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil on:

- kõrgeenenud vererõhk,
- südamehaigused (nt pikenenud QT sündroom),
- kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism),
- suhkruhaigus,
- eesnäärme suurenemine (prostata hüpertroofia),
- adrenaliini ja noradrenaliini tootvate neerupealiste healoomuline kasvaja (feokromotsütoom),
- kasutate või olete 2 viimase nädala jooksul kasutanud antidepressante, mida tuntakse MAO-inhibiitoritena.

Kui eelpool nimetatud kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Otrivin'i enne kui olete nõu pidanud arsti või apteekriga.

Sarnaselt teistele nina läbitavust parandavatele ravimitele, võib ka Otrivin väga tundlikel patsientidel suurendada unehäireid, pearinglust ja lihaskrampideid. Konsulteerige oma arstiga, kui kirjeldatud nähud hakkavad teile muret valmistama.

Sarnaselt teistele ninalimaskesta turset alandavatele ravimitele, tohib Otrivin'i kasutada järjest kuni 7 päeva. Sümptomite püsimisel pöörduge oma arsti poole. Ravimi pikaajaline või liiga suurtes annustes kasutamine võib põhjustada ninakinnisuse taasteket või sümptomite halvenemist.

Otrivin'i ei tohi manustada suhu või silma.

Ärge ületage lubatud annuseid, seda eelkõige laste ja eakate puhul.

## **Lapsed**

Otrivin 1 mg/ml ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

## **Muud ravimid ja Otrivin**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti ei tohi te kasutada Otrivin'i kui te kasutate samaaegselt teatud depressiooniravimeid:

- monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid (MAOI): ärge kasutage Otrivin'i kui te kasutate või olete viimase 14 päeva jooksul kasutanud MAO-inhibiitoreid,
- tritsüklilisi või tetratsüklilisi antidepressante.

Kui te kasutate mõnda ülalnimetatud ravimist, konsulteerige enne Otrivin'i kasutamist arstiga.

## **Rasedus ja imetamine**

Ärge kasutage Otrivin 1 mg/ml raseduse ajal. Kui te toidate last rinnaga, siis võib Otrivin 1 mg/ml kasutada vaid arsti soovitusel. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **Autojuhtimine ja masinate käsitsemine**

Otrivin 1 mg/ml ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

## **Otrivin sisaldab bensalkooniumkloriidi**

Ravim sisaldab 0,014 mg bensalkooniumkloriidi ühes pihustuses, mis vastab 0,1 mg/ml.

Bensalkooniumkloriid võib põhjustada ninas ärritust või turset, eriti pikaajalisel kasutamisel.

## **3. Kuidas Otrivin'i kasutada**

Kasutage Otrivin'i nii nagu allpool soovitatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Otrivin 1 mg/ml ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Vanus	Annustamine
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid	1 pihustus annustatud ninapihusega mõlemasse ninasõõrmesse 3 korda päevas, vastavalt vajadusele. Mitte manustada mõlemasse ninasõõrmesse üle kolme ravimiannuse päevas. Viimase ravimiannuse võib manustada vahetult enne magamaminekut.

1. Ärge lõigake otsikut. Annustatud ninasprei tuleb enne kasutamist aktiveerida.



2. Nuusake nina tühjaks.
3. Eemaldage kattedekork.
4. Enne esimest manustamist seadke pump töökorda, aktiveerides seda 4 korda. Pärast aktiveerimist jääb pump tavaliselt igapäevaste ravikuuride jooksul töökorda. Kui spreid täielikult allavajutamisel ei välju või kui preparaati ei ole kasutatud kauem kui 7 päeva, tuleb pump 4 vajutusega uuesti aktiveerida. Vältige manustamist silma ja suhu.
5. Hoidke pudel püstises asendis, asetades põidla pudeli põhjale ning otsiku 2 sõrme vahele.



6. Kallutage ennast kergelt ettepoole ja sisestage otsik ninasõõrmesse.
7. Vajutage pumbale, ise samaaegselt sisse hingates.



8. Korrata sama teise ninasõõrmega.
9. Puhastage ja kuivatage otsik ja asetage kork kohe pärast ravimi manustamist tagasi pudelile.
10. Võimaliku infektsioonileviku vältimiseks, tohib ühte pudelit kasutada üks inimene.

#### **Kui te manustate Otrivin'i rohkem, kui ette nähtud**

Kui te olete kasutanud Otrivin 1 mg/ml rohkem kui ette nähtud või kogemata ravimit alla neelanud, võtke otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga.

#### **Kui te unustate Otrivin'i manustada**

Kui olete annuse vahele jätnud, ärge manustage topeltannust.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka Otrivin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmiste nähtude tekkimisel lõpetage kohe Otrivin 1 mg/ml kasutamine ja pöörduge arsti poole, kuna need võivad olla allergilise reaktsiooni sümptomid:

- Hingamis- või neelamisraskused.
- Näo-, huulte, keele- või kõriturse.
- Raske nahasügelus koos punetava ja kublalise lööbega.

**Sageli esinevad kõrvaltoimed** (kuni ühel inimesel 10-st):

Nina limaskesta ärritusnähud või kuivus, iiveldus, peavalu, lokaalne kõrvetustunne.

**Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed** (kuni ühel inimesel 100-st):

Ninaverejooksud.

**Väga harva esinevad kõrvaltoimed** (vähem kui ühel inimesel 10 000-st):

Allergilised reaktsioonid (nahalööve, -sügelemine), nägemise hägustumine, südamerütmihäired või pulsi kiirenemine.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Otrivin'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast avamist võib kasutada kuni kõlblikkusaja lõpuni.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast "Kõlblik kuni"/"EXP". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Otrivin 1 mg/ml ninasprei, lahus sisaldab**

- Otrivin 1 mg/ml (niisutava koostisega) sisaldab toimeainena 1 mg/ml ksülometasoliinvesinikkloriidi.
- Abiained: bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumkloriid, vedel sorbitool (E 420) 70% (mittekristalliline), hüpromelloos 4000, puhastatud vesi.

### **Kuidas Otrivin välja näeb ja pakendi sisu**

Otrivin 1 mg/ml ninasprei on selge värvuseta peaaegu lõhnata lahus pihustiga pudelis. Pakend sisaldab 10 ml ravimit.

### **Müügiloa hoidja**

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Knockbrack

Dungarvan

Co Waterford  
Iirimaa

**Tootja**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG  
Barthstraße 4  
80339 München  
Saksamaa

**Infoleht on viimati uuendatud mais 2021.**