

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Allergodil 0,05% silmatilgad, lahus aselastiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast kahe päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Allergodil silmatilgad ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Allergodil silmatilkade kasutamist
3. Kuidas Allergodil silmatilkasid kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Allergodil silmatilkasid säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Allergodil silmatilgad ja milleks seda kasutatakse

Allergodil silmatilgad on allergiavastane aine.

Allergodil silmatilku kasutatakse hooajalise allergilise silmapõletiku (allergiline konjunktiviit, heinapalavik) profülaktikaks ja sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja lastel alates 4. eluaastast. (Hooajalised allergiad võivad olla põhjustatud näiteks kindlal aastaajal puude ja kõrreliste heintaimede õietolmust.)

Allergodil silmatilku kasutatakse ka aastaringselt esineva allergilise silmapõletiku (allergiline konjunktiviit) profülaktikaks ja sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja lastel alates 12. eluaastast. (Aastaringne allergia võib olla põhjustatud näiteks aastaringselt leiduvast elamutolmust, koduloomade karvadest või hallitusseentest.)

2. Mida on vaja teada enne Allergodil silmatilkade kasutamist

Allergodil silmatilku ei tohi kasutada:

- kui olete aselastiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Allergodil'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kui te ei ole kindel, et teilmade haigusnähud on põhjustatud allergiast. Seda eriti juhul, kui haaratud on ainult üks silm, kui teie nägemine on halvenenud või silmas on valu ning teil puuduvad nina haigusnähud.
- Kui haigusnähud süvenevad ega leevendu pärast 48 tunni möödumist vaatamata Allergodil silmatilkade kasutamisele. Allergodil silmatilgad ei ole ette nähtud kasutamiseks silmainfektsioonide korral.
- Bensalkooniumkloriid võib absorbeeruda pehmetesse kontaktläätsedesse ja muuta nende värvust. Eemaldage kontaktläätsed enne ravimi manustamist ja pange tagasi 15 minutit pärast manustamist.

- Bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmäärritust, eriti kui teil on kuivsilmsus või sarvkesta (silma eesmine läbipaistev osa) kahjustus. Kui tunnete ravimi kasutamise järgselt silmas ebamugavust, kipitust või valu, konsulteerige arstiga.

Lapsed

Hooajaline allergiline konjunktiviit:

Allergodil silmatiku ei tohi kasutada alla 4-aastastel lastel.

Aastaringselt esinev allergiline konjunktiviit:

Allergodil silmatiku ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Allergodil silmatilgad

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole seni täheldatud.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine: kuna väike kogus toimeainet eritub rinnapiima, siis ei tohi Allergodil silmatilku rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast Allergodil silmatilkade manustamist võib esineda kerge mööduv ärritus, mis tõenäoliselt ei mõjuta/halvenda teie nägemist. Kui teil siiski esineb mööduv nägemise halvenemine, siis ärge juhtige autot, kasutage masinaid või mehhanisme või töötage ilma vastavaid ettevaatusabinõusid tarvitamata nägemise selginemiseni.

Allergodil sisaldab bensalkooniumkloriidi

Ravim sisaldab 0,00375 mg bensalkooniumkloriidi ühes tilgas, mis vastab 0,00375 mg/0,03 ml.

3. Kuidas Allergodil silmatilkasid kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Juhul, kui arst ei ole teisiti määranud, on harilik annustamine järgmine:

manustage 1 tilk Allergodil silmatilku kummassegi silma kaks korda ööpäevas (hommikul ja õhtul). Vajadusel võib annust suurendada kuni üks tilk mõlemasse silma 4 korda ööpäevas.

Hooajaline allergiline konjunktiviit:

nimetatud annust võib kasutada täiskasvanutel ja lastel alates 4. eluaastast. Kui on eeldatav kokkupuude allergeeniga, siis peab allergilise reaktsiooni ennetamiseks Allergodil silmatilku manustama enne kodunt väljumist.

Aastaringselt esinev allergiline konjunktiviit:

nimetatud annust võib kasutada täiskasvanutel ja lastel alates 12. eluaastast.

Manustamisviis:

- Võtke puhas salvrätt ja kuivatage alalaug (vt Joonis 1). Keerake pudelilt kork.
- Kallutage pead kergelt tahapoole, tõmmake õrnalt alalaugu allapoole (vt Joonis 2) ja tilgutage ettevaatlikult 1 tilk alalau keskele (vt Joonis 3).
- Jälgige, et tilguti ots ei puutuks vastu teie silma.
- Vabastage alalaug ning suruge kergelt silma siseturka nina suunas (vt Joonis 4). Pilgutage aeglaselt oma silma mõned korrad, et ravimi tilk valguks ühtlaselt kogu silma pinnale.


- Eemaldage silmast välja valgunud liigne ravim.
- Korrake protseduuri teise silmaga.



Joonis 1



Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4

Pärast kaebuste kadumist jätkake Allergodil silmatilkade kasutamist seni, kuni puutute kokku allergiatekitajatega (nt õietolm, elamutolm).

Ravi kestus

Kuna kliinilistes uuringutes on tõestatud ravimi ohutus ja talutavus kasutamisel ainult kuni 6 nädalat, siis Allergodil silmatilkade kasutamine aastaringsest esineva allergilise konjunktiviidi korral peaks kestma maksimaalselt kuni 6 nädalat.

Hooajalise allergilise konjunktiviidi korral peab silmatilkade kasutamine, mis kestab kauem kui 6 nädalat, toimuma arsti järelevalve all.

Ärge kasutage Allergodil silmatilku arsti soovituseta kauem kui 6 nädalat.

Kui te kasutate Allergodil silmatilkasid rohkem kui ette nähtud

Silma manustamisel ei ole spetsiifilisi üleannustamisreaktsioone teada ja sellise manustamisviisi korral pole need ka ootuspärased.

Kui te unustate Allergodil silmatilkasid kasutada

Allergodil silmatilkade manustamise unustamine ei tingi erakorraliste meetmete rakendamist. Jätkake ravi tavalise annuse manustamisega ettenähtud ajal. Vajadusel võib Allergodil silmatilku manustada kahe ettenähtud manustamisaja vahel.

Kui te lõpetate Allergodil silmatilkade kasutamise

Kui võimalik, siis peaksite kasutama Allergodil silmatilku reeglipäraselt kuni kaebuste kadumiseni. Ravi katkestamisel võivad tüüpilised haigusnähud peagi korduda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (kuni 1 inimesel 10-st): kerged mööduvad silma ärritusnähud (nt kipitus, kihelus, pisaravool).

Aeg-ajalt (kuni 1 inimesel 100-st): mõru maitse suus.

Väga harv (kuni 1 inimesel 10 000-st): ülitundlikkusreaktsioonid.

Kasutatavad abinõud

Ülalmainitud kõrvaltoimed mööduvad tavaliselt kiiresti, mistõttu ei ole vaja erilisi abinõusid tarvitada.

Kui tunnete pärast Allergodil silmatilkade manustamist mõru maitset suus, siis see peaks kaduma juues peale alkoholvaba jooki (nt mahla, piima).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Allergodil silmatilkasid säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmakordset avamist

Ärge kasutage Allergodil silmatilku kauem kui 4 nädalat pärast pudeli esmakordset avamist. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Allergodil silmatilgad sisaldavad

- Toimeaine on aselastiinvesinikkloriid. 1 ml lahust sisaldab 0,5 mg aselastiinvesinikkloriidi. Üks ligikaudu 30 µl tilk sisaldab 0,015 mg aselastiinvesinikkloriidi.
- Abiained on bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, hüpromelloos, sorbitooli lahus (kristalluv), naatriumhüdrokksiid ja süstevesi.

Kuidas Allergodil silmatilgad välja näevad ja pakendi sisu

Allergodil silmatilgad on selge, värvitu lahus.
Allergodil silmatilgad on saadaval 6 ml mahuga pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

SIA Meda Pharma
Mūkusalas 101
Rīga LV-1004
Lāti

Tootja

Meda Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Homburg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Meda Pharma SIA
Liivalaia 13/15
11018 Tallinn
Tel: +372 6261 025

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2020.