

## Pakendi infoleht: teave kasutajale

### Pharmatex 18,9 mg vaginaalsuposiidid Bensalkooniumkloriid

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Pharmatex ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Pharmatex'i kasutamist
3. Kuidas Pharmatex'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Pharmatex'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Pharmatex ja milleks seda kasutatakse**

Pharmatex'i kasutamine võimaldab hoiduda rasestumisest, kuid ei anna 100% kaitset. Ravimi kontratseptiivne efektiivsus sõltub eelkõige selle õigest kasutamisest.

Rasestumisvastane ravim, mis sobib eriti hästi järgmistel juhtudel: rasestumisvastaste tablettide või emakasisese vahendi kasutamine on vastunäidustatud; suguelu on ebaregulaarne; sünnitus- või abordijärgsel perioodil; rinnaga toitmise ajal; menopausieelsel perioodil; suukaudsete tablettide kasutamise puhul, kui tableti võtmine on hilineanud. Viimasel juhul tuleks kasutada Pharmatex'i koos suukaudsete tablettidega kuni menstruatsioonitsükli lõpuni. Võib kasutada ka täiendavalt koos emakasisese spiraaliga.

#### **2. Mida on vaja teada enne Pharmatex'i kasutamist**

##### **Ärge kasutage Pharmatex'i**

- kui te olete bensalkooniumkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui te kasutate samaaegselt teisi tupesiseselt manustatavaid ravimeid
- vahetult enne ja pärast sugühet ei tohi pesta seebiga.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Pharmatex'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

**Rasestumisvastane toime sõltub eelkõige õigest kasutamisest.** Kasutatakse enne igat sugühet sõltumata menstruatsioonitsükli päevast. Korduva sugühte korral tuleb alati manustada uus annus. Pharmatex'i kasutades ei tohi enne ja pärast sugühet kasutada pesemiseks seepi, kuna viimane katkestab bensalkooniumkloriidi toime. **Väline tualett on lubatud ainult puhta veega või spetsiaalse seebialust mittesisaldava Pharmatex pesemisvahendiga.** Haavandite tekkimisel välissuguelunditele ravimi kasutamine lõpetada. **Tähelepanu! Ei kaitse suguhaigustesse nakatumise eest! Ainult tupesiseseks manustamiseks.**

##### **Muud ravimid ja Pharmatex**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid..

Pharmatex'iga üheaegselt ei tohi kasutada teisi tupesiseselt manustatavaid ravimeid ega pesta seebiga. Uuringud on näidanud, et Pharmatex ei kahjusta kondoomi kvaliteeti.

### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on mõeldud raseduse vältimiseks.

### **3. Kuidas Pharmatex'i kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga..

Ravimit kasutatakse tupesiseselt enne igat suguühet sõltumata menstruatsioonitsükli päevast. Vaginaalsuposiit (tupeküünal) vabastatakse pakendist ja viiakse tuppe 5 minutit enne suguühet, soovitatavalt lamavas asendis. Toime kestab **4 tundi**. Korduvate vahekordade puhul viia tuppe kindlasti uus tupeküünal. Kasutamisinstruktsiooni tuleb jälgida väga täpselt!

Kui teil on tunne, et Pharmatex'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravim võib üksikutel juhtudel põhjustada allergiat.

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. Kuidas Pharmatex'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

#### **Mida Pharmatex sisaldab**

- Toimeaine on bensalkooniumkloriid. Üks vaginaalsuposiit sisaldab toimeainena 18,9 mg bensalkooniumkloriidi.
- Abiained on: hüdroksüpropüülselluloos, poolsünteetiline glütseriid (Witepsol S51).

**Kuidas Pharmatex välja näeb ja pakendi sisu**

10 vaginaalsuposiiti karbis.

Valged pilklikud vaginaalsuposiidid.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

Müügiloa hoidja

Laboratoire Innotech International

22 avenue Aristide Briand

94110 Arcueil

Prantsusmaa

Tootja

Innothera Chouzy

Rue Rene Chantereau,

Chouzy-Sur-Cisse

41150 Valloire-Sur-Cisse

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Retlando

Aisa 8

80017 Pärnu

Tel. 5136092

**Infoleht on viimati uuendatud juulis 2020.**