

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Hexoral 0,2% suuõõnesprei, lahus heksetidiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Hexoral ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Hexoral'i kasutamist
3. Kuidas Hexoral'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Hexoral'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Hexoral ja milleks seda kasutatakse

Hexoral'i kasutatakse suuõõne ja neelu antiseptikaks põletike korral.

Hexoral soodustab haavade paranemist ja avaldab paikselt tuimastavat toimet suuõõnes ja neelus. Hexoral'i toimeaine heksetidiin on laia toimespektriga bakterite- ja seentevastane aine.

2. Mida on vaja teada enne Hexoral'i kasutamist

Hexoral'i ei tohi kasutada

- kui olete heksetidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kasutamisel tuleb vältida sissehingamist. Sprei võib sattuda hingamisteedesse ning esile kutsuda kõrikrampi.

Hexoral ei sobi kasutamiseks püsivate haigusnähtude korral, see tähendab, et kui te vaatamata ravile (kuni 10 päeva) ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate katkestama ravimi kasutamise ja võtma ühendust arstiga.

Muud ravimid ja Hexoral

Koostoimeid ei ole teada.

Hexoral koos toidu ja joogiga

Toimeaine heksetidiin kleepub limaskestade külge ja tagab seeläbi pikaajalise toime. Sel põhjusel tuleb ravimit manustada pärast sööki.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Hexoral'i kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Ei ole teada, kas toimeaine heksetidiin eritub rinnapiima. Kuna toimeaine heksetidiini süsteemne toime

ebaoluline, siis toimet raseduse kulule või rinnaga toidetavale vastsündinule/imikule ei ole oodata.

Nagu kõigi ravimite puhul ei tohi ka Hexoral'i kasutada raseduse või imetamise ajal väljaarvatud juhul, kui loodetak kasu emale kaalub üle võimaliku ohu lootele või imikule. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hexoral ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet .

Hexoral sisaldab etanooli ja naatriumi

Ravim sisaldab 41,6 mg alkoholi (etanool) ühes ml-s lahuses (4,16 % w/v). Alkoholi sisaldus selle ravimi ühes ml-s on väiksem kui 2 ml-s õlles või 1 ml-s veinis. Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes annuses, see tähendab põhimõtteliselt "naatriumivaba".

3. Kuidas Hexoral'i kasutada

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed:

Hexoral'i ühekordse toimeannuse manustamiseks tuleb pihustada 1...2 pihustust kestvusega 1...2 sekundit. Ravimit manustatakse kolm korda päevas või vajadusel ka rohkem, olenevalt seisundi tõsidusest või arsti korraldustest.

2...6-aastased lapsed:

2...6-aastastel lastel tohib Hexoral'i kasutada vaid arsti järelevalve all. Kuna neelamisrefleks ei ole täielikult välja arenenud ja suuõõnespreid ei tohi sisse hingata, siis tuleb seda pihustada vatitikule ja määrada vatitikuga kahjustunud limaskestadele kuni 3 korda päevas.

Ravimit tuleb manustada pärast sööki, kuna heksetidiin kleepub limaskestade külge ja tagab seeläbi pikaajalise toime.

Pihustage ravimit suhu või kurku. Mitte sisse hingata, võib esile kutsuda kõrikrampi!

Palun järgige allpool toodud juhiseid.

Keerake pihustitoru kergelt surudes pudeli pealmises osas olevasse vastavasse auku. Hoidke pihustitoru otsikut kehast eemal.

Hoidke pihustitoru suus (nagu näidatud pakendi infolehel oleval joonisel) ja suunake suu või kurgu sellesse piirkonda, mis vajab ravi. Hoidke pihustamise ajal alati pudelit otseasendis.

Pihustage vajalik kogus Hexoral'i, vajutades pihustile 1...2 sekundi vältel. Ärge pihustamise ajal hingake.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Hexoral'i rohkem, kui ette nähtud

Puuduvad tõendid, et Hexoral'i korduv, liigne manustamine põhjustaks ülitundlikkusreaktsioone.

Hexoral'i piisavas koguses sissevõtmine võib põhjustada alkoholimürgistuse sümptome.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lapsel üleannustamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole või võtke ühendust haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Turustamisjärgselt on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest, mille esinemissagedus on teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- ülitundlikkusreaktsioonid
- maitsetundlikkuse kadu, maitsetundlikkuse häire
- köha, hingeldus, kõrikramp
- suukuivus, neelamishäire, iiveldus, süljenäärmete suurenemine, oksendamine
- angioödeem (silmalaugude, huulte ja labakäte turse)
- manustamiskoha reaktsioonid (suu ja neelu limaskestast ärritus, suu vääraisting, keele värvuse muutused, hammaste värvuse muutus, põletik, villid ja haavandid).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Hexoral'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Pudel on rõhu all, mitte lasta kuumenda üle 50 °C. Lahuse lõppemisel pudelit mitte avada ega põletada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kasutada 6 kuu jooksul pärast pudeli avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hexoral sisaldab:

- Toimeaine on heksetidiin.
- Teised koostisosad on polüsorbaat 80, sidrunhappe monohüdraat, naatriumsahhariin, levomentool, eukalüptiõli, naatrium-kaltsiumedetaat, etanool, naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi, pihustusaine: lämmastik.

Kuidas Hexoral välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu, mündilõhnaline vedelik. Ravim on saadaval 40 ml alumiiniumist spreipakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght
Dublin 24
Iirimaa

Tootja:

Delpharm Orléans
5, avenue de Concyr
45071 Orléans
Cedex 2
Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2020.