

Pakendi infoleht: teave kasutajale

GeloMyrtol forte, 300 mg gastroresistentsed pehmekapslid

Eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektifitseeritud eeterlike õlide segust saadud destillaat
(66:32:1:1)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 10 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on GeloMyrtol forte ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne GeloMyrtol forte võtmist
3. Kuidas GeloMyrtol forte't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas GeloMyrtol forte't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on GeloMyrtol forte ja milleks seda kasutatakse

GeloMyrtol forte on taimse päritoluga ravim, toimeaine saadakse taimede eeterlikest õlidest. Sekreedi vedeldamiseks sinusiidi ja bronhiidi korral.

Kui pärast 10 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne GeloMyrtol forte võtmist

Ärge võtke GeloMyrtol forte't

- kui teil on mao, soolte või sapiteede piirkonnas põletikuline häire või kui teil on raske maksahaigus;
- kui olete eukalüpti õli, magusa apelsini õli, mürdi õli, sidruni õli või tsineooli (eukalüpti õli peamine koostisosa) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

GeloMyrtol forte't ei tohi anda alla 6-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne GeloMyrtol forte võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Konsulteerige otsekohe arstiga, kui sümptomid püsivad või halvenevad, kui tekib hingeldus või palavik või kui te hakkate kõhima röga, milles on verd või mädasarnast sekreti.
- Kui teil on bronhiaalastma, läkakõha või mõni muu hingamisteede haigus, millele on iseloomulik hingamisteede märkimisväärne ülitundlikkus, siis võite võtta GeloMyrtol forte't alles pärast seda, kui olete oma arstiga nõu pidanud.

GeloMyrtol forte ei sobi alla 6-aastastele lastele.
3...5-aastastele lastele on saadaval GeloMyrtol.

GeloMyrtol forte sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Muud ravimid ja GeloMyrtol forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Ravimi kasutamisel vastavalt soovitudele puuduvad teadaolevad koostoimed teiste ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

- Rasedus:
Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet lootele emaülas.
Loomkatsed ja aastatepikkune kogemus GeloMyrtol forte'ga inimeste ravimisel ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet lootele emaülas. Seega võib GeloMyrtol forte't raseduse ajal kasutada, kui see on kliiniliselt näidustatud. Nagu kõigi ravimite rasedusaegsel kasutamisel, tuleb ka enne GeloMyrtol forte kasutamist pidada nõu arstiga.
- Imetamine:
Toimeaine rasvlahustuvate omaduste tõttu võib eeldada, et selle komponendid jõuavad väikestes kontsentratsioonides ka rinnapiima. Siiani ei ole leitud tõendeid, et GeloMyrtol forte kasutamise ajal kaasneks mingeid riske.
Nagu kõigi ravimite imetamise-aegsel kasutamisel, tuleb ka enne GeloMyrtol forte kasutamist pidada nõu arstiga.
- Viljakus:
Loomkatsed ei näita GeloMyrtol forte otsest või kaudset kahjulikku toimet viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eriline ettevaatus ei ole vajalik.

3. Kuidas GeloMyrtol forte't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Vanus	Ägedate põletikuliste seisundite raviks:	Krooniliste põletikuliste seisundite raviks:
6...12 aastat	1 kapsel 1...3 korda ööpäevas	1 kapsel 1...2 korda ööpäevas
> 12 aastat	1 kapsel 3...4 korda ööpäevas	1 kapsel 2...3 korda ööpäevas

Kuidas ja millal võtta GeloMyrtol forte't?

Võtke GeloMyrtol forte't 30 minutit enne sööki koos rohke külma vedelikuga. Viimase annuse võib võtta enne magama heitmist.

Kui kaua jätkata GeloMyrtol forte võtmist?

GeloMyrtol forte-ravi kestus sõltub sümptomitest. Krooniliste hingamisteede haiguste puhul on võimalik pika-ajaline ravi.

Kui te võtate GeloMyrtol forte't rohkem kui ette nähtud

Palun teavitage oma arsti. Tema otsustab, kas te vajate mingit ravi. Teil võivad esineda allpool loetletud kõrvaltoimed tugevamal kujul.

Kui te unustate GeloMyrtol forte't võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake GeloMyrtol forte võtmist nii nagu arst on teile määranud või nagu on kirjeldatud annustamisjuhistes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamisel on aluseks järgnevad esinemissagedused:

Väga sage:	rohkem kui 1 ravitud patsiendil 10st
Sage:	1 kuni 10 ravitud patsiendil 100st
Aeg-ajalt:	1 kuni 10 ravitud patsiendil 1000st
Harv:	1 kuni 10 ravitud patsiendil 10 000st
Väga harv:	vähem kui 1 ravitud patsiendil 10 000st
Teadmata:	esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Aeg-ajalt võib esineda seedetrakti vaevusi, nt maovalu/ebamugavustunne ülakõhus, maitsetundlikkuse muutused. **Harvadel** juhtudel võib esineda iiveldust, oksendamist või kõhulahtisust.

Harvadel juhtudel on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest (nt nahalööve, sügelus, näoturse, hingeldus ja vereringehäired).

Väga harva võivad hakata liikuma olemasolevad neerukivid või sapikivid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas GeloMyrtol forte't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida GeloMyrtol forte sisaldab

- Toimeaine on eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektifitseeritud eeterlike õlide segust saadud destillaat (66:32:1:1). Üks kapsel sisaldab 300 mg eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektifitseeritud eeterlike õlide segust saadud destillaati (66:32:1:1).
- Teised koostisosad on puhastatud rapsiseemne õli, želatiin, glütserool 85%, hüpromelloos-atsetaatsuktsinaat, trietüültsitraat, vedel sorbitool (mittekristalliseeruv), naatriumlaurüülsulfaat, talk, dekstriin, ammoniumglütüürisaat, lahjendatud vesinikkloriidhape.

Kuidas GeloMyrtol forte välja näeb ja pakendi sisu

GeloMyrtol forte ravimvorm on värvimata läbipaistvad pehmed želatiinkapslid.

Saadaval on pakendi suurused 20, 50 või 100 gastroresistentset kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: + 372 7338080

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2016.