

Pakendi infoleht: teave kasutajale

OFTAN DEXA-CHLORA 1 mg/ 2mg/g silmasalv deksametasoon ja klooramfenikool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Oftan Dexa-Chlora silmasalv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutamist
3. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalvi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Oftan Dexa-Chlora silmasalv ja milleks seda kasutatakse

Oftan Dexa-Chlora silmasalv sisaldab deksametasooni ja klooramfenikooli. Deksametasoon sarnaselt kortisoonile leevendab põletikku ja ülitundlikkust (allergiat) ja vaigistab silmavalu. Klooramfenikool pidurdab silmapõletikku põhjustavate bakterite kasvu.

2. Mida on vaja teada enne Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutamist

Oftan Dexa-Chlora ei tohi kasutada

- kui olete deksametasooni või klooramfenikooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
- kui teil on silmatuberkuloos
- kui teil on viiruslik silmapõletik või silma seennakkus
- kui teie silmas on haavand

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Oftan Dexa-Chlora silmasalviga kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekri.

Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga. Deksametasooni pikaajaline (rohkem kui kaks nädalat) kasutamine võib suurendada silma siserõhku. Kortikosteroidide kasutamisel võib sarvkesta kahjustuste paranemine olla aeglasem.

Rääkige oma arstile, kui teil tekivad tursed ja kehakaalu tõus kehatüvel ja näos, kuna need on tavaliselt Cushingi sündroomi esimesed nähud. Neerupealiste funktsiooni pärssimine võib tekkida pärast pikaajalise ravi või intensiivse ravi lõpetamist Oftan Dexa-Chlora'ga. Rääkige oma arstiga enne omaalgatuslikku ravi lõpetamist. Need riskid on väga olulised eriti lastel ja patsientidel, keda ravitakse ravimitega nagu ritonaviir ja kobitsistaat.

Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutamise ajal ärge kontaktläätsi kandke.

Muud ravimid ja Oftan Dexa-Chlora

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rääkige oma arstiga, kui te võtate ritonaviiri või kobitsistaati, kuna see võib suurendada deksametasooni kogust veres.

Muud samaaegselt kasutatavad ravimid ei mõjuta Oftan Dexa-Chlora silmasalvi toimet olulisel määral.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Silmasalv võib põhjustada hägusat nägemist, mis möödub. Vahetult pärast silmasalvi kasutamist tuleks hoiduda autojuhtimisest kuni terava nägemise taastumiseni.

3. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

See ravim on vaid silma manustamiseks. Soovitatav annus on umbes 1 cm salvi 1...3 korda päevas. Salvi manustatakse alumise silmalau ja silma vahele jäävasse kotikesse.

Kui teil on tunne, et Oftan Dexa-Chlora toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.


Enne silmasalvi manustamist:

- peske käed.
- seiske peegli ette.

Manustamine:

1. Avage tuub. Ärge puudutage tuubi otsikuga mingeid pindu.

2. Tõmmake alumist silmalau allapoole, et moodustuks kotike. Asetage salvituubi otsik kotikese kohale nagu pildil näidatud ja vaadake siis üles.



3. Ärge puudutage salvituubi otsikuga ei silma ega silmalaugusid. Manustage kotikesse umbes 1 cm salvi.



4. Sulgege silmad ja pilgutage, et salv jaguneks ühtlaselt üle silma. Keerake kork tagasi.



Kui kasutate nii silmatilkasid kui ka -salvi, siis salv manustage viimasena.

Kui kasutate Oftan Dexa-Chlora silmasalvi rohkem, kui ette nähtud

Lokaalsel manustamisel silma on üleannustamine ebatõenäoline.

Kui te unustate Oftan Dexa-Chlora silmasalvi kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekri.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Oftan Dexa-Chlora silmasalv on tavaliselt hästi talutav. Pärast salvi manustamist võib esineda kipitust ja hägusat nägemist, mis mööduvad. Pikaajalisel kasutamisel võib tõusta silmasisene rõhk. Mitmeid kuid kestnud ravi korral võivad tekkida sarvkesta haavandid või hägusused.

Väga harva ja tingituna (pikajalisest) klooramfenikooli kasutamisest on esinenud luuüdi düsfunktsiooni (valge- ja punaliblede madal sisaldus).

Esinemissageduse teadmata (esinemissageduse ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Hormonaalsed häired: liigne karvakasv (eriti naistel), lihasnõrkus ja lihaskadu, punakad armid kehatüve nahal, vererõhu tõus, menstruatsiooni ebaregulaarsus või puudumine, valkude ja kaltsiumi sisalduse muutused teie organismis, pidurdunud kasv lastel ja teismelistel, tursed ja kehakaalu tõus kehatüvel ja näos (seda nimetatakse Cushingi sündroomiks), nägemise ähmastumine.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalvi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2 °C ---8 °C).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast „EXP”/„Kõlblik kuni“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast tuubi esmakordset avamist on silmasalv kõlblik 28 päeva.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsi oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oftan Dexa-Chlora silmasalv sisaldab

- Toimeained on deksametasoon 1 mg/g, klooramfenikool 2 mg/g.
- Teised abiained on vedel parafiin ja valge vaseliin.

Kuidas Oftan Dexa-Chlora silmasalv välja näeb ja pakendi sisu

Silmasalv on kahvatu, pehme, läbipaistev.

Alumiiniumist salvituub. Tuubis on 3,5 g silmasalvi.

Müügiloa hoidja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Soome

Tootja

Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Rome)
Itaalia

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere
Soome

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2021.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: <http://www.ravimiamet.ee/>.