

## **Pakendi infoleht: teave patsiendile**

### **Cyklokapron 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid** Traneksaamhape

**Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Cyklokapron ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cyklokapron'i võtmist
3. Kuidas Cyklokapron'it võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cyklokapron'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Cyklokapron ja milleks seda kasutatakse**

Cyklokapron kuulub antifibrinolüütikute nime all tuntud ravimite rühma. Neid ravimeid kasutatakse veritsuse vähendamiseks. Teile võidakse seda välja kirjutada järgnevatel põhjustel: pärast eesnäärmeoperatsiooni, suurte verejooksude korral menstruatsiooni ajal, ninaverejooksude puhul, emakakaela operatsioonide puhul, hamba väljatõmbamise korral hemofiilikutel, päriliku haiguse puhul, mida nimetatakse angioneurootiliseks turseks.

#### **2. Mida on vaja teada enne Cyklokapron'i võtmist**

##### **Ärge kasutage Cyklokapron'i**

- kui olete traneksaamhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on aktiivne trombembooliline haigus.
- kui teil on raske neerupuudulikkus, kuna ravim võib kumuleeruda.
- kui teil on esinenud krampe.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

- ebakorrapärase menstruatsiooni verejooksu puhul
- kui teil on kunagi esinenud trombi, nt jalas või kopsus
- neeruhaiguse korral
- dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni korral
- vere esinemisel uriinis
- traneksaamhappe raviga seoses on täheldatud krampide esinemist. Enamik neist juhtudest teatati pärast südameoperatsiooni järgset traneksaamhappe veenisest lubatust suuremate annuste manustamist.

##### **Muud ravimid ja Cyklokapron**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

##### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kliinilised kogemused Cyklokapron'i kasutamisest rasedatel on piiratud. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Cyklokapron eritub rinnapiima, kuid terapeutiliste annuste kasutamisel on toime imikule ebatõenäoline. Igatahes pidage enne ravi alustamist arstiga nõu.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Cyklokapron ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

## **3. Kuidas Cyklokapron'i võtta**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele on 2...3 tabletti 2...3 korda ööpäevas. Olenevalt, mis näidustusel teile seda rohtu antakse, võivad annused olla erinevad.

Tabletil on poolitusjoon ning ülal- ja allpool tähed CY.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

### Menorraagia.

Soovitatakse annus 2...3 tabletti 3...4 korda ööpäevas niikaua kui vaja kuni 4 päeva. Väga tugevate menstruatsiooni verejooksude korral võib annust suurendada 2 tabletti 6 korda ööpäevas. Ravi ei tohi alustada enne menstruatsiooni vereerituse algust.

### Raskekujuline ninaverejooks.

Kui on oodata korduva verejooksu, tuleb rakendada suukaudset manustamist 3 tabletti (1,5 g) 3 korda ööpäevas 4...10 päeva vältel.

### Emakakaela konisatsioon.

3 tabletti 3 korda ööpäevas 12...14 päeva jooksul pärast operatsiooni.

### Pärilik angioneurootiline turse.

Mõned patsiendid on teadlikud oma haigushoo algusest; nendel patsientidel on sobivaks annuseks 2...3 tabletti vahelduvalt 2...3 korda ööpäevas mõne päeva jooksul. Teistel patsientidel tuleb sama annusega jätkata pidevat ravi.

Tablette tuleb võtta koos klaasitäie veega. Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge purustage või närige tablette.

Kui teil on tunne, et Cyklokapron'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Kui te võtate Cyklokapron'it rohkem kui ette nähtud**

Kui te võtate kogemata liiga palju Cyklokapron'i tablette, pöörduge viivitamatult meditsiinilise abi saamiseks arsti poole.

Märkideks ja sümptomiteks võivad olla pearinglus, peavalu, vererõhu langus, krampid, iiveldus ja kõhulahtisus. On täheldatud, et krampide esinemissagedus võib suureneda traneksaanhappe annuse suurendamisel.

### **Kui te unustate Cyklokapron'it võtta**

Kui te unustasite tablette võtta, võtke järgmine annus harilikul ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage ( $\geq 1/100$  kuni  $< 1/10$ ): iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Kõrvaltoimed kaovad annuse vähendamisel. Konsulteerige sellel teemal oma arstiga.

Harv ( $\geq 1/10\ 000$  kuni  $< 1/1000$ ): värvide nägemise häired, allergilised nahareaktsioonid.

Väga harv ( $< 1/10\ 000$ ): trombemboolia juhud.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): närvisüsteemi häired: krampid, peamiselt lubatust suuremate annuste intravenoossel kasutamisel (vt lõik 2).

#### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

#### **5. Kuidas Cyklokapron'it säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril, sildil ja karbil pärast „EXP“.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

#### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

##### **Mida Cyklokapron sisaldab**

- Toimeaine on traneksaamhape. Üks Cyklokapron'i õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg traneksaamhapet.
- Abiained on mikrokristalliline tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, talk, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba räni ja povidoon. Tableti kattes metakrülaatpolümeer, titaandioksiid (E171), talk, magneesiumstearaat, polüetüleenglükool 8000 ja vanilliin.

##### **Kuidas Cyklokapron välja näeb ja pakendi sisu**

Cyklokapron'i tabletid on valge piklikud õhukese polümeerikattega tabletid. Tableti ühel küljel on märgistus „CY“, mille kohal ja all on kaar.

Tabletid on plastikpudelites või blisterpakendites, mis sisaldavad 20, 50 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

##### **Müügiloa hoidja**

Meda AB  
Box 906  
17009 Solna  
Rootsi

**Tootjad:**  
MEDA Manufacturing GmbH  
Neurather Ring 1  
51063 Köln  
Saksamaa

või

Madaus GmbH  
Lütticher Str. 5  
53842 Troisdorf  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Meda Pharma SIA  
Liivalaia 13/15  
11018 Tallinn  
Tel: +372 6261025

**Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2019.**