

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **FERVEX, suukaudse lahuse graanulid (suhkruvaba)**

Paratsetamool, feniramiinmaleaat, askorbiinhape

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Fervex ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Fervex võtmist
3. Kuidas Fervex'it võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Fervex'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Fervex ja milleks seda kasutatakse**

Fervex'it kasutatakse samaaegseks palaviku alandamiseks, valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja üle 15-aastastel noorukitel. Fervex sisaldab kolme toimeainet:

- paratsetamool, mis leevendab valu ja alandab palavikku;
- allergiavastane aine feniramiinmaleaat, mis vähendab eritust ninast, ninakinnisust, pisaravoolust ja aevastamist;
- vitamiin C (askorbiinhape), vähendamaks organismi suurenenud vajadust selle järele palaviku ja külmetushaiguste korral.

#### **2. Mida on vaja teada enne Fervex'i kasutamist**

##### **Fervex'it ei tohi kasutada:**

- kui on teada allergia (ülitundlikkus) paratsetamooli, feniramiinmaleaadi, C-vitamiini või Fervex'i mõne koostisosa suhtes;
- kui te põete rasket maksahaigust;
- kui teil esineb glaukoom (silma kõrgeenenud siserõhu haigus);
- kui teil esineb eesnäärme suurenemine;
- vanuses alla 15- eluaasta;
- see ravim sisaldab aspartaami (fenüülalaniini allikas), mistõttu seda ei tohi kasutada fenüülketonuuria korral (pärilik haigus);
- kui teil on diagnoositud glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudumine (hemolüütilise aneemia oht);
- kui kasutate samaaegselt monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit ning kuni 2 nädalat pärast ravi lõpetamist MAO inhibiitoriga;
- kui olete rase või toidate last rinnaga.

##### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fervex:**

- kui teil esineb neerupuudulikkus (vt lõik 3).

## **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Fervex kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Muud ravimid ja Fervex:**

Fervex'i kasutamise ajal alkoholi tarbimine või rahustite kasutamine ei ole soovitatav. Kui te kasutate vett väljutavaid ravimeid või olete pikemat aega kasutanud valuvaigisteid, siis enne Fervex'i kasutamist küsige nõu arstilt või apteekrilt. Üleannustamise vältimiseks kontrollige, et samaaegselt manustatavad ravimid ei sisalda paratsetamooli.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

### **Rasedus ja imetamine:**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Kuna võimalik risk rasedusele ei ole teada, sest loomkatsete ja kliiniliste uuringute andmed puuduvad, siis on selle ravimi kasutamine raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine:**

Ravi ajal ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, sest selle ravimi kasutamisega võib kaasneda päevane unisus.

### **Fervex sisaldab mannitooli.**

Fervex sisaldab mannitooli, mis võib mõnel patsiendil põhjustada seedehäireid või kõhulahtisust.

## **3. Kuidas Fervex'it võtta**

Võtke Fervex'it alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on 1 kotike 2...3 korda ööpäevas. Kahe manustamiskorra vahele peab jääma vähemalt 4-tunnine intervall. Neerupuudulikkuse korral peab kahe manustamiskorra vahele jääma vähemalt 8-tunnine intervall.

Puistake kotikese sisu klaasi, valage peale kuuma või külma vett ning segage kuni lahustumiseni. Jooge lahus koheselt.

Kui teil on tunne, et Fervex'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

### **Kui te võtate Fervex'it rohkem kui ette nähtud**

Rääkige koheselt sellest arstile või apteekrile.

Paratsetamooli üleannustamine suurtes kogustes põhjustab rasket maksakahjustust. Mürgistuse varajased nähud ilmnevad tavaliselt 24 tunni jooksul (iiveldus, oksendamine, isutus, üldine halb enesetunne, teadvushäired). Raske mürgistuse kahtlusel tuleb pöörduda otsekohe haiglasse.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka Fervex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Suukuivus, kõhukinnisus, urineerimishäired, unisus, uimasus või unetus, akommodatsioonihäired (silma kohenemisvõimetus eri kaugusel olevate objektide nägemisel) ja müdriaas (pupilli laienemine), südamekloppimine, vererõhulangus, segasus või erutus. Tasakaalu- või koordineerimishäired, värisemine, kontsentratsiooni- või mäluhäired võivad esineda sagedamini vanemaelistel. Harva on esinenud mõned neutropeenia, leukopeenia või trombotsütopeenia (vähene hulk vererakke, mis omavad tähtsust infektsioonide tõrjes või vere hüübimises) juhtumid. Mõnedel harvadel juhtudel on esinenud nahalöövet (naha punetus, nõgestõbi, sügelus) ja/või allergilisi reaktsioone.

Kui teil tekib nimetatud kõrvaltoimeid, siis lõpetage kohe Fervex'i kasutamine ja konsulteerige arstiga.

### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Fervex'it säilitada**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Fervex'it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Fervex sisaldab:**

- Toimeained on paratsetamool, feniramiinmaleaat ja askorbiinhape (vitamiin C). Ühes kotikeses sisaldavad graanulid paratsetamooli 500 mg, feniramiinmaleaati 25 mg ja askorbiinhapet (vitamiin C) 200 mg.
- Abiained on mannitool, veevaba sidrunhape, polüvidoon, veevaba magneesiumtsitraat, aspartaam ja Lääne-India aroomiaine.

### **Kuidas Fervex välja näeb ja pakendi sisu**

Suukaudse lahuse graanulid kotikestes (paber-alumiinium-polüetüleen). Kotikesed on karpides. Ühes karpis on 8 kotikest.

### **Müügiloa hoidja**

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison

Prantsusmaa

### **Tootja**

UPSA SAS

304, avenue du Docteur Jean Bru

47000 Agen

Prantsusmaa

või

UPSA SAS

979 Avenue des Pyrénées

47520 Le Passage

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Swixx Biopharma OÜ

tel: 640 1030

e-post: medinfo.estonia@swixxbiopharma.com

**Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2019.**