

PAKENDI INFOLEHT
Veyxyl Tabs, 800 mg intrauteriintabletid

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
D-34639 Schwarzenborn
Saksamaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Veyxyl Tabs, 800 mg intrauteriintabletid
Amoksiitsilliin

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1 intrauteriintablett sisaldab amoksiitsilliini 800 mg, mis vastab 918,4 mg amoksiitsilliintriühdraadile.

Abiained: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat, kartulitärklis, laktoosmonohüdraat, sahharoos, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Amoksiitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud haiguste ravi.

Kasutusala: emaka infektsioonid, päramiste peetus.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada loomadele, kellel esineb ülitundlikkust penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes;

Mitte manustada loomadele, kellel esineb oliguuriaga ja anuuriaga kulgev neerukahjustus;

Mitte manustada beeta-laktamaase produtseerivate patogeenide esinemisel;

Mitte manustada suukaudselt hobustele ja mäletsejalistele;

Mitte manustada küülikutele, merisigadele, hamstritele ja väikenärilistele.

6. KÕRVALTOIMED

Allergilised reaktsioonid (allergilised nahareaktsioonid, anafülaksia).

Allergiliste reaktsioonide esinemisel tuleb koheselt lõpetada Veyxyl Tabs manustamine.

Vastumeetmed:

Anafülaksia korral: epinefriin (adrenaliin) ja glükokortikosteroidid i.v.

Allergiliste nahareaktsioonide korral: antihistamiinsed ained ja/või glükokortikosteroidid.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Veis, siga, hobune, lammas.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intrauteriineks manustamiseks.

Hobused: 800 mg amoksitsilliini, mis vastab 1 Veyxyl Tabs intrauteriintabletile.

Veised: 400...800 mg amoksitsilliini, mis vastab ½ kuni 1 Veyxyl Tabs intrauteriintabletile.

Lambad, sead: 400 mg amoksitsilliini, mis vastab ½ Veyxyl Tabs intrauteriintabletile.

Ravi korrata vajadusel 48 tunni pärast.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik 8 “Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod.”

10. KEELUAEG

Veis, lammas ja hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva;
piimale: 1 päev.

Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Inimesed, kes on penitsilliini suhtes ülitundlikud, peaksid vältima veterinaarravimi otsest kokkupuudet naha ja limaskestadega.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.

Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.

Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda

arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse ning hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi. Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon:

Tiinuse ajal mitte kasutada.
Võib kasutada sünnituspuhuselt.
Võib kasutada laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Penitsilliinide ja kiiretoimeliste bakteriostaatiliste kemoterapeutikumide vahel võib esineda antagonismi.

Üleannustamine:

Üleannustamise korral võib tekkida kesknärvisüsteemi erutus ja spasmid. Ravi Veyxyl Tabs'iga tuleb koheselt lõpetada ning rakendada sümptomaatilist ravi.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2015

15. LISAINFO

Pakendi suurus: 10 ja 20 intrauteriintabletti polüstüreenist lükandkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Magnum Veterinaaria
Vae 16, Laagri 76401,
Saue vald, Harjumaa,
Eesti
Tel. +372 650 1920