

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Hepagen, 100 mg/ml süstelahus**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Fatro S.p.A.  
Via Emilia, 285  
40064 Ozzano Emilia (Bologna)  
Itaalia

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Hepagen, 100 mg/ml süstelahus  
2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana)

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

1 ml süstelahust sisaldab:

**Toimeaine:**

2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana) 100 mg

**Abiained:**

Dinaatriumedetaat, naatriummetüülparahüdrosübensoaat (E219),  
naatriumpropüülparahüdrosübensoaat (E217), süstevesi.

Selge, värvitu lahus.

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

**6. KÕRVALTOIMED**

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

**7. LOOMALIIGID**

Hobune, veis, siga, kits, koer.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Manustada sügavalt intramuskulaarselt, intraperitoneaalselt või aeglaselt intravenoosselt 10 mg kg kehamassi kohta.

Veis, hobune, siga: 10 ml 100 kg kehamassi kohta.

Kits, koer: 1 ml 10 kg kehamassi kohta.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Vt lõik Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod

## **10. KEELUAEG**

0 päeva.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

## **12. ERIHOIATUSED**

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Mitte manustada koos kaltsiumisooli sisaldavate preparaatidega.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

## **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsi palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

#### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

veebruar 2016

#### **15. LISAINFO**

Pakend: 100 ml, 1 tk pakendis.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Dimedium  
Emajõe 1a  
51008 Tartu  
Eesti Vabariik