

PAKENDI INFOLEHT
Drontal, 230 mg/20 mg õhukese polümeerikattega tabletid kassidele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Strasse 324
24106 Kiel
Saksamaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Drontal, 230 mg/20 mg õhukese polümeerikattega tabletid kassidele
püranteelbonaat
prasikvanteel

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett (339 mg) sisaldab:

Toimeained:

Püranteelbonaat 230 mg (vastab 80 mg püranteelile)
Prasikvanteel 20 mg

Abiained:

Titaandioksiid (E 171) 1,8 mg

Õhukese polümeerikattega tablett.

Ovaalse kujuga, valge kuni kollakasvalge tablett poolitusjoonega keskel.

Tablette saab jagada võrdseteks poolteks.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Järgmiste ümarusside ja paelusside segainfestatsioonide raviks kassidel:

askariidide täiskasvanud vormid: – *Toxocara cati* (sün *mystax*)

kõõrpeausside täiskasvanud vormid: – *Ancylostoma tubaeforme*

– *Ancylostoma braziliense*

paelussid: – *Echinococcus multilocularis*

– *Dipylidium caninum*

– *Hydatigera (Taenia) taeniaformis*

– *Mesocestoides* spp

– *Joyeuxiella pasqualei*

Kuna paelussiinfestatsioon esineb kassidel kõige varem kolmandal elunädalal, ei ole ravi Drontaliga näidustatud varem kui 3. elunädalast.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla kolme nädala vanustel kassipoegadel.

Mitte kasutada tiinuse ajal.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainetega suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Väga harvadel juhtudel võivad esineda kerged ja mööduvad seedetraktihäireid nagu süljeerituse suurenemine ja/või oksendamine ning kerged ja mööduvad neuroloogilised häired nagu koordinatsioonipuue.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud)

7. LOOMALIIGID

Kass.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Annus

5 mg prasikvanteeli ja 57,5 mg pürantelembonaati (vastab 20 mg püranteelile) 1 kg kehmassi kohta. See vastab 1 tabletile 4 kg kehmassi kohta.

<i>Kehamass</i>	<i>Tabletid</i>
1,0...2,0 kg	½
2,1...4,0 kg	1
4,1... 6,0 kg	1 ½
6,1...8,0 kg	2

Manustamisviis

Suukaudne.

Ravi kestus

Manustada ravimit üks kord.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Tabletid anda kas otse suhu või vajadusel toidu sisse peidetuna. Ravimi manustamisele eelnev või järgnev dieet ei ole vajalik.

Ehhinokokoosi diagnoosi korral tuleb alustada spetsiaalse strateegiaga ravi, järelkontrollide ja isikukaitse rakendamist. Seetõttu on soovitatav pidada nõu eriarstiga või parasitoloogia instituutidega. Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.

10. KEELUAEG

Ei rakendata

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Hävitada kõik kasutamata poolitatud tabletid.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kirbud on ühe levinuma paelussiliigi *Dipylidium caninum* vaheperemeesteks. Kui vaheperemeeste, nagu kirbud ja närilised, tõrjet ei tehta, toimub kindlasti uus nakatumine paelussiga.

Askariidide nakkuse korral (eriti kassipoegadel) ei toimu parasiitide täielikku hävimist, seega risk inimeste nakatumiseks säilib. Seetõttu tuleb ravi korrata sobiva ümarussidevastase ravimiga 14 päevase intervalliga kuni võõrutusest on möödunud 2...3 nädalat.

Hoiduda tuleb järgnevatest tegevustest, kuna need suurendavad riski ravimresistentsuse väljakujunemiseks ning võivad viia ravi mittetoimimiseni:

- liiga sagedane ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine pikema perioodi vältel
- liigne alaannustamine, mis on tingitud looma kehamassi ebaõigest hindamisest või ravimi väärkasutamisest

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Pärast ravimiga kokkupuutumist pesta käed.

Muud ettevaatusabinõud

Ehhinokokoos on inimestele ohtlik. Ehhinokokoos on OIE (Maailma Loomatervise Organisatsiooni) teatamiskohustuslik haigus ja konkreetsed juhised ravi ja järelkontrolli teostamiseks ning inimeste kaitsmiseks on kättesaadavad Veterinaar- ja Toiduametist.

Tiinus ja laktatsioon

Vastavate uuringute puudumise tõttu mitte kasutada tiinuse ajal.

Lubatud kasutada laktatsiooni perioodil.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Üleannustamise sümptomid ei avaldu alla 5 kordsete soovitatud annuste manustamisel. Esmane mürgistuse sümptom on oksendamine.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2020

15. LISAINFO

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Pakendid 2 või 24 tabletiga alumiinium-polüetüleen lamineeritud fooliumis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaaravimi kohta pöörduge palun müügihoa hoidja kohaliku esindaja poole.