

PAKENDI INFOLEHT
Vitaminthe, suukaudne pasta koertele ja kassidele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vitaminthe, suukaudne pasta koertele ja kassidele

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml suukaudset pastat sisaldab:

Toimeained:

Niklosamiidi 0,24 g
Oksübendasooli 0,03 g

Abiained:

Naatriumdisulfit, naatriumbensoaat (E211), dekvaliinkloriid, ksantaankummi, naatriumpolünaftaleensulfonaat, dimetikoon 300, naatriumtsük lamaat, anšoovise pulber, vahuvastane aine 70426, puhastatud vesi.

Kreemikas kuni kollane pasta.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Paelusstõbede, ümarusstõbede ja kidausstõbede ravi koortel ning kassidel.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel kassipoogadel või kutsikatel.

Mitte kasutada kõhulahtisuse või soolesulguse korral.

Mitte kasutada, kui kahtlustate resistentsust bensimidiasoolide suhtes.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Harva (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast) võib täheldada mööduvaid seedehäireid (kõhulahtisus, oksendamine). Väljaheide võib ajutiselt pehmeks muutuda.

Harvadel juhtudel võib täheldada letargiat ja neuroloogilisi sümptomeid (nt treemor, ataksia ja tasakaaluhäired).

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)

- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Koer, kass.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudseks manustamiseks.

Manustada 15 mg oksübendasooli ja 120 mg niklosamiidi 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,5 ml suukaudsele pastale 1 kg kehamassi kohta.

5 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 0,5 kg kehamassile.

10 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 2 kg kehamassile.

25 ml süstal: iga gradatsioonivahemik vastab 10 kg kehamassile.

Preparaat tuleb manustada ühekordse annusena otse keelele või segada toidu hulka.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.

Koerakutsikad ja kassipojad: ravida kaks korda neljanädalase intervalliga 6. ja 12. elunädala vahel.

Täiskasvanud loomad: ravida iga kuue kuu järel.

Emasloomad: ravida 3 korda aastas – paaritusperioodil, üks nädal enne poegimist ja 3...4 nädalat pärast poegimist.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t. punkt „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod“.

10. KEELUAEG

Ei rakendata.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimresistentsuse väljakujunemise ning selle tulemusel ravi mittetoimise vältimiseks mitte kasutada liiga sageli ja korduvalt sama klassi anthelmintikume pikema perioodi jooksul.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule

Teadaoleva ülitundlikkuse korral toimeainete suhtes vältida preparaadi otsest kokkupuudet nahaga. Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kõrvaldage nakkusohtlikud väljaheited. Ärge laske lapsi ravitud loomade juurde.

Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Üleannustamine

Üleannustamise korral võib täheldada neuroloogilisi sümptomeid, nt treemor, ataksia ja tasakaaluhäired

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2023

15. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Zoovetvaru
Uusaru 5
Saue 76505
Tel: 800 9000