

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Faringodol forte 150 mg losengid koliinsalitsülaad

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 1...2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Faringodol forte ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Faringodol forte kasutamist
3. Kuidas Faringodol forte't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Faringodol forte't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Faringodol forte ja milleks seda kasutatakse

Faringodol forte losengides (imemistablettides) sisalduv koliinsalitsülaad on salitsüülhappe derivaat. Salitsülaadidel on põletikuvastane, sealhulgas ka valuvaigistav toime. Koliini manustamine suurendab süljeeritust, mis lisandub preparaadi põletikuvastasele toimele. Koliinsalitsülaadil on nõrk bakteritsiidne toime.

Faringodol forte losenge sobib kasutada neelu, suu limaskesta, igeme ja hambajuureümbrise põletiku sümptomaatiliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne Faringodol forte kasutamist

Faringodol forte losenge ei tohi kasutada

- kui te olete salitsülaatide, teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) koostisosade suhtes allergiline
- söögitoru veenilaiendite korral (verejooksu oht)
- kui teil on fenüülketonuuria
- kui teie alla 12-aastasele lapsele on näidustatud atsetüülsalitsüülhapet sisaldavaid ravimeid

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- kui te olete rase
- seedetrakti põletikuliste haiguste, peptilise haavandtõve või bronhiaalastma korral
- kui teie laps on alla 12-aastane

Enne Faringodol forte kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Faringodol forte

Salitsülaadid võivad vähendada samaaegselt manustatud mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite toimet ning suurendada rahustite, uinutite, veresuhkru taset alandavate ravimite ja antikoagulantide toimet.

Nii steroidsed kui mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja vere hüübivust vähendavad ravimid võivad salitsülaatidega koosmanustamisel suurendada maoverejooksu riski.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib kasutada juhul kui arst nii soovitab. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Faringodol forte sisaldab isomalti, maltitoolilahust ja aspartaami

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

See ravim sisaldab 1,75 mg aspartaami ühes losengis. Aspartaam on fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik, kui teil on fenüülketonuuria, mis on harvaesinev geneetiline häire, mille korral fenüülalaniini ei lammutata ja see koguneb organismi.

3. Kuidas Faringodol forte´t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: tavaliselt üks loseng 4...6 korda päevas.

6...12-aastased lapsed: maksimaalne annus on 4 losengi päevas.

Kui kurguvalu ei vähene 1...2 päeva jooksul, tuleb konsulteerida arstiga.

Kui te kasutate Faringodol forte´t rohkem, kui ette nähtud

Ravimvormi (losengid) ja minimaalse imendumise tõttu on üleannustamise võimalus äärmiselt ebatõenäoline.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võivad suukaudsete salitsülaatide kasutamisel tekkida allergilised reaktsioonid (naha punetus või lööve, köha, ninakinnisus, näo turse, neelamis- ja hingamisraskus) või seedetrakti limaskesta kahjustus (kõhuvalu, oksendamine, seedetrakti verejooks).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Faringodol forte´t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Faringodol forte sisaldab

- Toimeaine on koliinsalitsülaat.
- Teised abiained on isomalt (E953), maltitoolilahus, mündiõli (osaliselt dementoliseeritud), kaaliumatsesulfaam ja aspartaam (E951).

Kuidas Faringodol forte välja näeb ja pakendi sisu

Valkjad või helekollakad, silindrikujulised, õrnalt kaksikkumerad losengid.
PVC/alumiiniumfooliumist blisterpakend pappkarbis, mis sisaldab 16 või 32 losengi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja ja tootja

Müügiloo hoidja:

Richard Bittner AG
Reisnerstraße 55-57
A-1030 Wien
Austria

Tootjad:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poola

või

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EWA" Spółka Akcyjna
ul. Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole.

Omega Pharma Baltics SIA
K. Ulmaņa 119
Mārupe LV-2167
Läti

E-post: CHCIESTONIAINFO@PERRIGO.COM

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2021.