

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Neo-angin, losengid

2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Neo-angin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Neo-angin'i võtmist
3. Kuidas Neo-angin'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Neo-angin'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Neo-Angin ja milleks seda kasutatakse

Neo-angin on suuõõne ja neelu antiseptiline ja valuvaigistav ravim, mis toimib suu- ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele ja seentele.

Neo-angin'i kasutatakse suu-, kurgu-, neelu- ja igemepõletike korral.

2. Mida on vaja teada enne Neo-Angin'i võtmist

Ärge võtke Neo-angin'i:

- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Neo-angin ei sobi kasutamiseks alla 6-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Neo-Angin

Koostoimeid teiste ravimitega pole täheldatud.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Neo-angin koos toidu ja joogiga

Ravimit võib võtta söögiaegadest sõltumata.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole asjakohane.

Neo-angin losengid sisaldavad värvainet Ponceau 4R punane (E124), glükoosi ja sukroosi

Neo-angin sisaldab värvainet Ponceau 4R punane (E 124), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Neo-Angin sisaldab 1,14 g glükoosi ja 1,42 g sukroosi ühes losengis, mis vastab ligikaudu 10 kcal-le (42 kJ). Sellega tuleb arvestada suhkrutõbe põdevatel patsientidel.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes losengis, st on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Neo-Angin´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud, noorukid ja üle 6-aastased lapsed võivad manustada ühe losengi 2...3 tunni järele, lastel sellel aeglaselt suus sulada. Suurim päevane annus on 6 losengi.

Kui 3...4 päeva möödudes haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Kui Teil on tunne, et Neo-angin´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Neo-angin´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Neo-angin´i võtmise

Pole asjakohane.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võib esineda seedehäireid ja limaskesta ärritusnähte.

Värvaine košenillpunane A (E 124) võib põhjusta allergilisi reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Neo-Angin´i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP:“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Neo-Angin sisaldab

- Toimeained on 2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool.
Üks loseng sisaldab: 1,20 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi, 0,60 mg amüülmetakresooli, 5,90 mg levomentooli.
- Abiained on tähtaniisiõli, piparmündiõli, sukroos, viinhape, vedel glükoos, Ponceau 4R punane (E 124).

Kuidas Neo-Angin välja näeb ja pakendi sisu

Neo-angin loseng on ümmargune, punane, kergelt läbipaistev.

Pakendis on 24 või 48 losengi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Divapharma GmbH

Motzener Straße 41

D-12277 Berliin

Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2021.