

Pakendi infoleht: teave kasutajale

neo-angin, losengid

2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3...4 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on neo-angin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne neo-angin'i võtmist
3. Kuidas neo-angin'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas neo-angin'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on neo-angin ja milleks seda kasutatakse

Neo-angin on suuõõne ja neelu antiseptiline ja valuvaigistav ravim, mis toimib suu- ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele ja seentele.

Neo-angin'i kasutatakse suu-, kurgu-, neelu- ja igemepõletike korral.

Neo-angin on näidustatud täiskasvanutele, noorukitele ja üle 6-aastastele lastele.

Te peate rääkima oma arstiga, kui pärast 3...4 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini.

2. Mida on vaja teada enne neo-angin'i võtmist

Neo-angin'i ei tohi võtta

- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne neo-angin'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed

Ärge andke neo-angin'i alla 6-aastastele lastele. Neo-Angin'i kasutamiseks peavad lapsed olema võimelised losengi kontrollitult imema.

Muud ravimid ja neo-angin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ravimi kasutamisel ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud.

Neo-angin koos toidu ja joogiga

Ravimit võib võtta söögiaegadest sõltumata.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Andmed neo-angin'i toimeainete kasutamise kohta rasedatel naistel puuduvad või on piiratud. Loomkatsed ei viita otsestele või kaudsetele kahjulikele toimetele reproduktiivtoksilisusele. Kuna ebapiisava informatsiooni tõttu ei saa täielikult välistada riski lootele, ei ole selle ravimi kasutamine raseduse ajal soovitatav.

Imetamine

Andmed toimeainete/metoboliitide eritumise kohta rinnapiima on ebapiisavad. Seega ei ole neo-angin'i kasutamine imetamise ajal soovitatav.

Viljakus

Toime hindamiseks viljakusele ei ole uuringuid läbi viidud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt ei mõjuta autojuhtimist ja masinate käsitlemist, kuid vastavaid uuringuid ei ole läbi viidud.

Neo-angin losengid sisaldavad värvainet Ponceau 4R (E124), glükoosi ja sukroosi

Neo-angin sisaldab värvainet Ponceau 4R (E 124), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Neo-angin sisaldab 1,14 g glükoosi ja 1,42 g sukroosi ühes losengis, mis vastab ligikaudu 10 kcal-le (42 kJ). Sellega tuleb arvestada suhkrutõbe põdevatel patsientidel.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

See ravim võib sisaldada vääveldioksiidi või sulfiteid, mis võivad harvadel juhtudele põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone ja bronhospasmi.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes losengis, st on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas neo-angin'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on

Täiskasvanud, noorukid ja üle 6-aastased lapsed võivad manustada ühe losengi 2...3 tunni järel, lastel sellel aeglaselt suus sulada. Suurim ööpäevane annus on 6 losengi.

Kui te unustate neo-angin'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te võtate neo-angin'i rohkem, kui ette nähtud

Seni ei ole üleannustamisest teatatud.

Kuigi üleannustamise tõenäosus on ebatõenäoline, võivad sel juhul kirjeldatud kõrvaltoimed intensiivistuda. Sellisel juhul on soovitatav sümptomaatiline ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, lõpetage neo-angin'i kasutamine ja võtke otsekohe ühendust oma arstiga:

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):

- suu- ja seedetrakti limaskesta ärritusnähud nagu düspepsia, iiveldus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- allergilised reaktsioonide nagu suu, keele ja huulte turse, lööve.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas neo-angin'i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida neo-angin sisaldab

- Toimeained on 2,4-diklorobensüülalkohol, amüülmetakresool, levomentool.
Üks loseng sisaldab: 1,20 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi, 0,60 mg amüülmetakresooli, 5,90 mg levomentooli.
- Abiained on tähtaniisiõli, piparmündiõli, sukroos, viinhape, vedel glükoos, Ponceau 4R (E 124) (sisaldab naatriumi).

Kuidas neo-angin välja näeb ja pakendi sisu

Neo-angin loseng on ümmargune, punane, kergelt läbipaistev.

Pakendis on 24 või 48 losengi, PVC/PVDC alumiiniumblistrid pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Divapharma GmbH
Motzener Straße 41
D-12277 Berliin
Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2024.