

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Prospan 20 mg/ml, suukaudsed tilgad, lahus luuderohu ekstrakt

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateab esaamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 10 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Prospan ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Prospan'i võtmist
3. Kuidas Prospan'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Prospan'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Prospan ja milleks seda kasutatakse

Prospan suukaudseid tilku kasutatakse köha korral röga lahtistamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Prospan'i võtmist

Prospan'i ei tohi võtta

- kui te olete luuderohu või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
- kui te olete alkoholi võõrutusravil,
- alla 1-aasta vanused lapsed.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Prospan'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Alla 1-aastastele lastele ei tohi Prospan'i suukaudseid tilkasid anda.

Muud ravimid ja Prospan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Prospan'i samaaegsel kasutamisel teiste ravimitega tekkida võivatest kõrvaltoimetest siiani andmed puuduvad. Seetõttu tohib seda ravimit ohutult kasutada koos teiste ravimitega (näiteks antibiootikumidega).

Prospan koos toidu ja joogiga

Puuduvad erilised ettevaatusabinõud.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eesmärgipärasel kasutamisel toime autojuhtimisele ja masinatega töötamisele puudub.

Prospan'i suukaudsed tilgad sisaldavad alkoholi

Ravim sisaldab 388 mg alkoholi (etanool) ühes milliliitris lahuses, mis vastab 47 mahuprotsendile. Alkoholi sisaldus selle ravimi ühes annuses on väiksem kui 8 ml-s õlles või 4 ml-s veinis.

Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet.

3. Kuidas Prospan'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, kehtivad Prospan'i annustamisel järgmised juhised. Palun järgige neid, sest vastasel korral ei pruugi Prospan tõhusalt mõjuda.

Täiskasvanud ja lapsed alates 10 eluaastast manustavad 24 tilka (50,4 mg luuderohu kuivekstrakti) 3 korda ööpäevas, 4...10 aastased lapsed manustavad 16 tilka (33,6 mg luuderohu kuivekstrakti) 3 korda ööpäevas ja 1...4 aastased lapsed manustavad 12 tilka (25,2 mg luuderohu kuivekstrakti) 3 korda ööpäevas.

Tilgad tuleks alati sisse võtta enne toidukorda. Väikelastele on soovitatav tilku manustada koos vähese hulga puuviljamahlaga.

Ravi kestus sõltub sümptomite tüübist ja raskusest, aga see peaks kestma vähemalt nädal aega, isegi kui tegemist on hingamisteede kergema põletikuga.

Et kindlustada ravi efektiivsust, tuleks ravimit manustada veel 2...3 päeva pärast sümptomite kadumist.

Kui teil on tunne, et Prospan'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Prospan'i rohkem, kui ette nähtud

Soovitatud ravimiannust ei tohiks ületada. Ravimi lubatust tunduvalt suuremates annustes (rohkem kui kolmekordne päevadoos) sissevõtmise korral võib esineda iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Kui te unustate Prospan'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim tekitada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Väga harva (harvem kui 1 patsiendil 10 000'st) võib tekkida allergiline reaktsioon.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Prospan'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Eritingimused puuduvad.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast pudeli esmakordset avamist säilib 6 kuud.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Prospan sisaldab

- Toimeaine on luuderohulehtede kuivekstrakt [5-7,5:1]. 1 ml lahust sisaldab 20 mg luuderohu kuivekstrakti (5-7,5 : 1). (tõmmiseks: etanool 30 kaalu%)
- Teised koostisosad on sahharinaatrium, aniisiõli, ristiköömneõli, piparmündiõli, 96% etanool, puhastatud vesi.

Kuidas Prospan välja näeb ja pakendi sisu

Prospan on pruun, kergelt hägune lahus (võib sisaldada hõljuvaineid ja/või sadet), õrna alkoholi ja apteegitilli lõhnaga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Swixx Biopharma OÜ

Tel: +372 640 1030

e-post: medinfo.estonia@swixxbiopharma.com

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2022.