

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

### NEOCONES, 15400 RÜ + 5 mg hambapulgad Neomütsiinsulfaat, bensokaiin

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- 

#### Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on NEOCONES ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne NEOCONES`i kasutamist
3. Kuidas NEOCONES`i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas NEOCONES`i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

## 1. MIS RAVIM ON NEOCONES JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

NEOCONES hambapulki kasutatakse täiendava ravina hambasombupõletiku (alveoliidi) puhul pärast hambasombu vaatlust ja puhastamist.

Sisaldab kahte toimeainet:

- Neomütsiin, antibiootikum, mis tapab olemasolevaid baktereid.
- Bensokaiin, lokaalanestetikum, mis tuimestab ajutiselt valuliku piirkonna.

## 2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NEOCONES`i KASUTAMIST

### NEOCONES`i ei tohi kasutada

- Kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeainete neomütsiini ja bensokaiini või mõne teise selle ravimi koostisaine suhtes (vt lõik 6).
- Kui teil on esinenud ülitundlikkus bensokaiini suhtes (või olete ülitundlik ester-tüüpi paiksete tuimestite suhtes).
- Kui teil on esinenud allergia neomütsiini ja/või sama rühma (aminoglükosiidide) antibiootikumide suhtes.
- Kui te olete allergiline (ülitundlik) nisu suhtes, kuna see ravim sisaldab nisutärklist.
- Piimahammastel (alla 12-aastastel lastel).

### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik NEOCONES`iga

- Kui teid on ravitud neomütsiiniga hambaekstraktsioonile eelnenud kuul, ei tohi seda ravimit kasutada, et vältida võimalikku vastupanuvõime tekke riski antibiootikumide suhtes.
- Enne ravi NEOCONES`iga öelge oma hambaarstile, kui teil esineb või on esinenud allergiat.
- Seda ravimit tuleb kasutada ettevaatlikult raske kuulmispuude, raske neeruhaiguse ja lihashaigusega (*myasthenia gravis*) patsientidel.

## **Lapsed**

NEOCONES on vastunäidustatud alla 12-aastastele lastele. Ravim ei sobi piimahammaste raviks. Lastel tuleb ravimit kasutada väga ettevaatlikult, sest neil on suurem oht methemoglobineemia tekkeks.

## **Muud ravimid ja NEOCONES**

Teatage oma hambaarstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid, sh ilma retseptita ostetud ravimeid.

## **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma hambaarstiga, enne kui ta kasutab teil seda ravimit.

### ***Rasedus***

NEOCONES sisaldab neomütsiini, aminoglükosiidi, millega kaasneb toksilisuse risk sisekõrvale või neerudele.

Võimaliku süsteemse imendumise tõttu ei tohi NEOCONES`i raseduse ajal kasutada.

### ***Imetamine***

Aminoglükosiidid erituvad rinnapiima vähesel määral. Puuduvad andmed bensokaiini eritumise kohta rinnapiima. Manustamisviisist tulenevalt tohib seda ravimit siiski imetavatel naistel kasutada.

## **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

NEOCONES avaldab vähest või mõõdukat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

## **NEOCONES`i kasutamine ja sport**

Sportlasi tuleb hoiatada, et see toode sisaldab toimeainet, mis põhjustab tõenäoliselt positiivse dopingukontrolli tulemust.

## **Oluline teave mõnede NEOCONES`i koostisainete kohta**

NEOCONES sisaldab nisutärklist.

Kuna NEOCONES`i ei neelata, võib seda kasutada tsöliaakiat põdevatel patsientidel.

Nisuallergiaga (erineb tsöliaakiast) patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

## **3. KUIDAS NEOCONES`i KASUTADA**

Teie hambaarst selgitab teile, miks teid ravitakse NEOCONES`iga. Ta kohandab annuse teie ravist olenevalt. Soovitav annus on 1 või 2 hambapulka, mis tuleb aseptilistes tingimustes võtta viaalist ning paigutada hambasompu pärast selle vaatlust ja puhastamist. Kui hambasomp on väga väike, võib hambapulga lühemaks lõigata. Hambaarst katab seejärel hambasombu 10 minutiks vatitupsuga, kuni NEOCONES on lahustunud.

Sellisest ravimvormist tulenevalt saab hambapulka kergesti pintsettide vahele võtta.

### **Kui teie hambaarst kasutab NEOCONES`i rohkem kui ette nähtud**

NEOCONES`i kasutamisel vastavalt soovitudele ei ole üleannustamist oodata.

### **Kui te lõpetate NEOCONES`i kasutamise**

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga.

## **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Hambaarsti vastuvõtul olles jälgib teie hambaarst teid hoolikalt NEOCONES`i võimalike kõrvaltoimete osas.

Kui te märkate endal mõnda järgmistest kõrvaltoimetest või teisi, selles infolehes loetlemata mis tahes kõrvaltoimet, rääkige sellest arstile:

Immuunsüsteemi häired:

Teadmata (olemasolevate andmete põhjal ei saa esinemissagedust hinnata):

- Allergilised reaktsioonid, mis on põhjustatud ristuvast sensibilisatsioonist para-aminobensoehappe derivaatidega (sulfoonamiidid, mõned paiksed tuimastid, säilitusained, värvained)
- Neomütsiinallergia risk

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma hambaarsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. KUIDAS NEOCONES'i SÄILITADA**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Teie hambaarst ei kasuta seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Teie hambaarst hoiab ravimit külmkapis (2°C...8°C) ning hoiab pudeli tihedalt suletuna väliskarbis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Teie hambaarst või apteeker teab, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE**

### **Mida NEOCONES sisaldab**

- Toimeained on neomütsiinsulfaat, bensokaiin. Üks 50 mg hambapulka sisaldab 15400 RÜ neomütsiinsulfaati ja 5 mg bensokaiini.
- Abiained on nisutärklis, laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat.

### **Kuidas NEOCONES välja näeb ja pakendi sisu**

NEOCONES on valged lõhnatud pulgad.

NEOCONES on saadaval pudelites, mis sisaldavad 50 või 100 hambapulka.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

PRANTSUSMAA

Tel. +33 1 49 76 70 00

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

**Eesti**

AS Sirowa Tallinn  
Salve 2c  
11612 TALLINN

**Latvia**

AS Sirowa Riga  
Kakasekla dambis 31  
RIGA LV-1045

**Lithuania**

UAB Sirowa Vilnius  
Eišiškių pl. 8A, LT-02184 VILNIUS

**Infoleht on viimati uuendatud juunis 2016.**