

## PAKENDI INFOLEHT

### Isaderm, geel koertele

#### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

##### MÜÜGILOA HOIDJA:

Dechra Veterinary Products A/S  
Mekuvej 9  
7171 Uldum  
Taani

##### PARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD:

Genera Inc.,  
Svetonedeljska cesta 2  
Kalinovica  
10436 Rakov Potok  
Horvaatia

#### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Isaderm, geel koertele.

#### 3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

##### 1 g geeli sisaldab:

Toimeaineid:

Fusidiinhapet 5 mg  
Beetametasooni (valeraadina) 1 mg

Abiained: Metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), karbomeer, polüsorbaat 80, dimetikoon, naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi.

#### 4. NÄIDUSTUSED

Püotraumaatilise dermatiidi („hot spot“) ja intertriigo paikseks raviks.

#### 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada impetiigo, follikuliidi, akne ega süva püoderma korral, sest nende patoloogiate korral on glükokortikoidide kasutamine vastunäidustatud.

Mitte kasutada seeninfektsioonide ja Cushingi haiguse korral.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainetega suhtes.

#### 6. KÕRVALTOIMED

Lokaalselt manustatavad steroidid võivad põhjustada naha õhenemist ja kapillaaride hapraks muutumist. Isaderm'i manustamise järel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon. Kortikosteroidid võivad aeglustada haavade paranemist.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## **7. LOOMALIIGID**

Koer.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS JA –MEETOD**

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Geeli määratakse kaks korda päevas kahjustunud nahapinnale vähemalt viis päeva järjest. Ravi jätkatakse veel kaks päeva pärast paranemist. Ravikuur ei tohiks kesta kauem kui seitse päeva.

Kui 3 päeva jooksul ravimi manustamisest paranemist ei märgata või seisund isegi halveneb, tuleb diagnoosi täpsustada.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Vaata lõik „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis ja –meetod“.

## **10. KEELUAEG**

Ei rakendata.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.

Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

Kõlblikusaeg pärast pakendi esmast avamist: 6 nädalat.

Pärast pakendil märgitud kõlblikusaja lõppu mitte kasutada.

## **12. ERIHOIATUSED**

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Beetametasoonvaleraat imendub läbi naha ja võib põhjustada ajutise neerumanuste talitluse pidurduse.

Ravimi pikaajalise kasutamise või suurte nahapindade töötlemise korral, aga samuti juhul, kui koeral on võimalus töödeldud nahapinda lakkuda, peab arvestama süsteemse kahjustuse võimalusega. Kui koer kratsib või lakub töödeldud nahapinda, tuleb kasutada kaitsekraed.

Vältida ravimi kontakti silmadega.

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Kortikosteroidid võivad põhjustada pöördumatuid nahamuutusi. Kortikosteroidid võivad mõjuda kahjulikult eriti sagedase ja rohke kontakti korral (pikema aja jooksul). Geeli manustav inimene peab kandma kaitsekindaid, et vähendada preparaadist tulenevat ohtu. Pärast preparaadi manustamist tuleb pesta käed.

Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus):

Lokaalselt manustatavad steroidid võivad põhjustada naha õhenemist ja kapillaaride hapraks muutumist. Isaderm'i manustamise järel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon. Kortikosteroidid võivad aeglustada haavade paranemist.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil:

Tiinuse ja imetamise ajal mitte kasutada.

**13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

**14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Jaanuar 2021

**15. LISAINFO**

5 g, 15 g või 30 g geeli alumiiniumtuubis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Dimedium  
info@dimedium.ee