

PAKENDI INFOLEHT
Albionic, intramammaarlahus lakteerivatele lehmadele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja:
Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerp
Belgia

Partii vabastamise eest vastutav tootja:
Biovet Joint Stock Company
39, Petar Rakov Str.
4550 Peshtera
Bulgaaria

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Albionic, intramammaarlahus lakteerivatele lehmadele

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

10 ml intramammaarlahust sisaldab:

Toimeained:

Linkomütsiini 330 mg
(mis vastab linkomütsiinvesinikkloriidile)
Neomütsiini (neomütsiinsulfaadina) 100 mg

Abiained:

Dinaatriumedetaat.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Linkomütsiinile ja neomütsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonide raviks lakteerivatele lehmadel.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Staphylococcus spp, (nii penitsillinaasi tootvad kui mittetootvad tüved)

Staphylococcus aureus,

Streptococcus agalactiae,

Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus uberis,

Escherichia coli.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik millis(te) abiaine(te) suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Veis (lakteerivad lehmad).

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ainult udarasiseseks manustamiseks. Süstal on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Annustamine: Manustada üks süstlatäis (10 ml) igasse haigestunud udaraveerandisse. Korrata manustamist 12 tunnise intervalliga 3 korda järjest, nii et igasse udaraveerandisse manustatakse kokku 3 süstlatäit.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Lüpske udar täiesti tühjaks. Desinfitseerige nidad alkoholilapi või mõne muu sobiva desinfitseerimisvahendiga, kasutades iga nisa jaoks eraldi lappi. Eemaldage süstla plastikotsalt kate. Valige sobiv sisestamispikkus (täielikult või osaliselt) ja sisestage süstlaots nisajuhasse. Manustage kolvivajutusega kogu süstla sisu ja masseerige udaraveerandit, et ravim jaotuks piimaurkes. Pärast manustamist on soovitatav desinfitseerida kõik nidad vastava desinfitseeriva vahendiga.

10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva (72 tundi).

Piimale: 3,5 päeva (84 tundi).

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele, arvestada tuleb ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule

Inimesed, kes on linkomütsiini või neomütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Vältida preparaadi kokkupuudet nahaga.

Pärast preparaadi käsitlemist pesta käed.

Tiinus

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon

Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.

Koostoimed

Mitte kasutada koos makroliididega, näiteks erütromütsiiniga, kuna linkomütsiin ja makroliidid konkureerivad üksteisega seondumiskohal ribosoomi 50 S alaühikul.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ravim on hästi talutav. Ka juhusliku üleannuste korral ei ole tõenäoline, et loomal tekivad paiksed või süsteemsed reaktsioonid, kuid nende ilmnemisel tuleb koheselt teatada loomaarstile.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsi palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2020

15. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Eesti

Tel: 800 9000