

Pakendi infoleht: teave kasutajale  
**Cuprum-Heel**  
tabletid

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- 
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- 
- 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- 
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

**Infolehe sisukord**

1. Mis preparaat on Cuprum - Heel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cuprum - Heel'i kasutamist.
3. Kuidas Cuprum -Heel'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cuprum - Heel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

**1. MIS RAVIM ON CUPRUM - HEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Cuprum-Heel on homöopaatiline preparaat.

**2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CUPRUM – HEEL'i KASUTAMIST**

**Ärge võtke Cuprum-Heeli, kui**

- te olete allergiline või ülitundlik Cuprum - Heeli mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.
- teil on ülitundlikkus kummeli ja teiste korvõieliste taimede suhtes.

Muud ravimid ja Cuprum-Heel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

**Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Toimet ei ole täheldatud.

**Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Cuprum - Heeli kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

**Cuprum-Heel sisaldab laktoosi.**

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Cuprum - Heeli kasutamist konsulteerima arstiga.

### **3. KUIDAS CUPRUM - HEEL'i KASUTADA**

Võtke Cuprum - Heel alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.  
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.  
Vajadusel võib algul võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Cuprum - Heeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

**Kui te võtate Cuprum-Heeli rohkem kui ette nähtud**  
Üleannustamisest ei ole teavitatud

**Kui te unustate Cuprum-heeli võtta**  
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

**Kui te lõpetate Cuprum-heeli võtmise**  
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Cuprum - Heel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  
Preparaat sisaldab taimseid komponente. Harvadel juhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone.  
**Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. KUIDAS CUPRUM - HEELi SÄILITADA**

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Ärge kasutage Cuprum – Heeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab sellele kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

**Mida Cuprum – Heel sisaldab**

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

1. Citrullus colocynthis D4 30 mg;
2. Ammonium bromatum D4 30 mg;
3. Atropinum sulfuricum D6 30 mg;
4. Veratrum album D6 30 mg;
5. Magnesium phosphoricum D6 30 mg;
6. Gelsemium sempervirens D6 30 mg;
7. Passiflora incarnata D2 15 mg;
8. Agaricus D4 15 mg;
9. Matricaria recutita D3 15 mg;
10. Cuprum sulfuricum D6 15 mg;
11. Aconitum napellus D6 60 mg.

Abiaine: magneesiumstearaat 1,5 mg

### **Kuidas Cuprum – Heel välja näeb ja pakendi sisu**

Pappkarp, milles plastmasspurk 50 või 250 tabletiga.

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakas-valge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks kollakaspruunid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

**Tel. +372 - 6328 830**

**e-mail: [info@aconit.ee](mailto:info@aconit.ee)**

**Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014**