

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Bolfo, ravimkaelarihm kassidele ja koertele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII  
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja:

Bayer Animal Health GmbH  
Leverkusen 51368  
Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,  
Projensdorfer Str. 324,  
24106 Kiel,  
Saksamaa

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Bolfo, ravimkaelarihm kassidele ja koertele  
Propoksuur

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

**Toimeaine:**

Üks ravimkaelarihm (koertele ja kassidele) 12,5 g ja 38 cm sisaldab propoksuuri (2-isopropoksüfenüül-N-metüülkarbamaati) 1,234 g  
Üks ravimkaelarihm (koertele) 45 g ja 70 cm sisaldab propoksuuri (2-isopropoksüfenüül-N-metüülkarbamaati) 4,442 g

**Abiained:** sojaõli, steariinhape, di-n-butüüladipaat, propüleenglükooldikaprolükapraat, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), polüvinüülkloriid.

Pruun ravimkaelarihm.

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Kirpude (*Ctenocephalides* spp) ja puukide (*Ixodes ricinus*) tõrjeks ja profülaktikaks koertel ja kassidel.

Ravimkaelarihm vabastab pidevalt toimeainet. Kirbud hävitatakse mõne tunni jooksul pärast ravimkaelarihma peale panekut. Kinnitunud puugid hävivad umbes päeva pärast. Seejärel saab need lihtsalt eemaldada või langevad need ise maha. Harvadel juhtudel võib ravimkaelarihma kandmise ajal näha kinnitunud puuke, kuid need vaid kaevuvad nahka ja siis langevad maha, tavaliselt verd imemata. Toime kirpude vastu kestab kuni 3 kuud.  
Toime puukide vastu kestab kuni 8 nädalat.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada haigetel (eriti neil kellel on soole- või kuseteede sulgus, bronhiaalastma või mõni muu kopsude või vereringesüsteemi haigus) või haigusest paranematel loomadel.

Mitte manustada:

- imetavatele koertele ja kassidele
- loomadele tiinuse lõpul
- alla 3 kuu vanustele kutsikatele ja kassipoegadele
- laialdaste nahakahjustustega loomadele
- toiduloomadele.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

## **6. KÕRVALTOIMED**

Kõrge tundlikkusega koertel võib esimestel päevadel pärast ravimkaelarihma paigaldamist esineda naha ärritust/sügelust. Nende sümptomite ilmnemisel tuleb ravimkaelarihm eemaldada, kuni sümptomid on kadunud. Spetsiifilist ravi ei vaja.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## **7. LOOMALIIGID**

Kass, koer.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Üks ravimkaelarihm ühele loomale ümber kaela kinnitamiseks.

Kassidele ja väikest kasvu koertele: ravimkaelarihm kaaluga 12,5 g ja pikkusega 38 cm.

Suurt kasvu koertele: ravimkaelarihm kaaluga 45 g ja pikkusega 70 cm.

Eemaldada ravimkaelarihm kaitsekotist, rullida lahti ja eemaldada ravimkaelarihma sees olevad plastikribad. Asetada ravimkaelarihm vabalt ümber looma kaela ja lükata ülejäänud ravimkaelarihm läbi silmuse. Ravimkaelarihma ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata (soovitav on, et kaks sõrme mahub ravimkaelarihma ja kaela vahele).

Esimestel päevadel tuleb kontrollida nahka ravimkaelarihma piirkonnas, kuna ravimkaelarihma surve võib mõnel loomal põhjustada ärritust. Ravimkaelarihma õiget asendit tuleb kontrollida regulaarselt. Ravimkaelarihma toimeaeg sõltub karvkatte pikkusest ja seisundist, looma aktiivsusest ja parasiitide rohkusest. Et tagada ravimkaelarihma täielik toime tuleks sassis, pulstunud ja määrdunud karvkatttega loomad enne ravimkaelarihma paigaldamist šampooniga pesta. Kui ravimkaelarihma toime lõppeb, tuleb see asendada. Karvkatte eest hoolitsemine võib jätkuda nagu enne. Enne vannitamist eemaldada ravimkaelarihm lemmikloomalt ning paigaldada see tagasi alles siis, kui karvkate on kuiv. Sagedane kokkupuude veega (vihm, ujumine, vannitamine) võib vähendada ravimkaelarihma efektiivsust. Kirbuinvasiooni korral tuleb kõik majapidamises olevad lemmikloomad ravida sobiva insektitsiidiga.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Vt. lõik 8 (annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod).

Lisaks kirpudele kassil või koeral, võib kirpude munade, vastsete ja nukkudega olla saastunud ka ümbritsev keskkond. Nendest kasvavad lõpuks uued kirbud. Seetõttu on ravi efektiivsuse suurendamiseks soovitatav töödelda lemmikloomade asemeid, nende vahetut ümbrust ja eelistatud puhkekohti sobiva insektitsiidiga või putukate kasvuregulaatoriga (IGR).

## **10. KEELUAEG**

Ei rakendata.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida eemal toidust ja loomasöödast.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“ . Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## 12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Sagedane kokkupuude veega (vihm, ujumine, vannitamine) võib vähendada ravimkaelarihma efektiivsust.

Ettevaatusabinõud:

Lapsed peavad vältima kontakti loomadega, kes kannavad ravimkaelarihma.

Mitte lubada lastel ravimkaelarihmaga mängida ja seda närida. Ravimi juhuslikul allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte ja/või pakendi etiketti.

Vältida kontakti naha ja silmadega.

See preparaat sisaldab karbamaati. Toksiliste sümptomite ilmnemisel otsida meditsiinilist abi.

Hoida eemal toidust ja loomasöödast.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Ravimkaelarihm on näidustatud välispidiseks kasutamiseks insektitsiidina.

Mitte lubada loomadel ravimkaelarihma närida.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Preparaadi käsitsemisel mitte süüa, juua ega suitsetada.

Pärast ravimkaelarihma kasutamist pesta käed põhjalikult seebi ja veega.

Inimesed, kellel on teadaolev ülitundlikkus toimeaine propoksuuri või mistahes abiaine suhtes, peaksid vältima kontakti selle veterinaarravimiga.

Bolfo't ei tohiks käsitseda naised raseduse kolmandal trimestril.

Hoida pakendit korralikult suletuna kuni kasutamiseni.

Tiinus ja laktatsioon:

Karbamaadid võivad silelihastes põhjustada kontraktsioone. Seetõttu ei tohiks Bolfo't kasutada hilises tiinuse järgus. Mitte kasutada imetavatel koertel ja kassidel.

Koostoimed:

Mitte ravida ravimkaelarihma kandvat looma teiste insektitsiidide ega akaritsiididega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Preparaadi omaduste tõttu ebatõenäoline.

Juhusliku allaneelamise korral võivad esineda talumatuse või intoksikatsiooni tunnused nagu suurenenud süljeeritus, pupilli ahenemine, oksendamine ja kõhulahtisus.

Antidoot: atropiinsulfaat.

Keskkonnaomadused:

See ravim on äärmiselt toksiline veeorganismidele, lindudele ja mesilastele.

Koertel ja kassidel, kes kannavad ravimkaelarihma, tuleb see alati eemaldada enne ujutamist ja pesemist, kuna toimeaine on kahjulik veeorganismidele.

See ravim võib tekitada pikatoimelisi kahjustusi veekeskkonnale.

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Pakendit mitte uuesti kasutada. Kasutamata pakendid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Mitte saastada jõgesid, veehoidlaid, vooluveekogusid, paise ja teisi veekogusid selle ravimiga. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Jaauuar 2022

### **15. LISAINFO**

*Pakendid:*

Ravimkaelarihm kaaluga 12,5 grammi ja pikkusega 38 cm 1 tk pakendis.

Ravimkaelarihm kaaluga 45 grammi ja pikkusega 70 cm 1 tk pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Magnum Veterinaaria  
Vae 16  
76401 Laagri, Saue vald  
Harjumaa  
Tel. +372 6 501 920