

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bepanthen 50 mg/g kreem dekspantenool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Bepanthen kreem ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Bepanthen kreemi kasutamist
3. Kuidas Bepanthen kreemi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Bepanthen kreemi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Bepanthen kreem ja milleks seda kasutatakse

Bepanthen kreemi aktiivne koostisaine dekspantenool muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib seega B₅ vitamiinina. Dekspantenooli eeliseks on tema parem imendumine paiksel manustamisel. Pantoteenhappel on keskne osa raku ainevahetuses. Pantoteenhape on inimorganismile vajalik naha ja limaskestade regeneratsiooniks.

Näidustus

Kerged nahakahjustused.

2. Mida on vaja teada enne Bepanthen kreemi kasutamist

Bepanthen kreemi ei tohi kasutada

- kui olete dekspantenooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loeteldud lõigus 6) suhtes allergiline.

Rasedus ja imetamine

Bepanthen kreemi kasutamine pole vastunäidustatud raseduse ajal ega rinnaga toitmise perioodil. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bepanthen kreem sisaldab tsetüülalkoholi, stearüülalkoholi, lanoliini ja propüleenglükooli

Tsetüülalkohol, stearüülalkohol ja lanoliin võivad tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

Ravim sisaldab 1500 mg propüleenglükooli 100 g kreemis, mis vastab 15 mg/g.

3. Kuidas Bepanthen kreemi kasutada

- Imiku naha hoolduseks määratakse nahale mähkmete vahetamise ajal.
- Imetamise ajal võib määrada rinnanibudele iga toitmiskorra järel.
- Pindmiste haavade, nahamarrastuste ja -lõhede raviks manustatakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.

- Paranemise ja epitelisatsiooni soodustamiseks, regulaarseks nahahoolduseks kantakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bepanthen kreemi, mis on väga õrna (vesialuselise) ning kiiresti imenduva koostisega, on soovitatav eelistada katmata kehaosade (käed, küünarnukid ja nägu) ravimisel ja karvkattega piirkonnas.

Bepanthen kreem sobib hästi ka päikesepõletuste ning kergemate põletuste raviks.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harvadel juhtudel on esinenud allergilisi nahareaktsioone. Sellisel juhul pöörduge oma arsti poole.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Bepanthen kreemi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil pärast märget EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bepanthen kreem sisaldab

- Toimeaine on dekspantenool. 1 g kreemi sisaldab 0,05 g dekspantenooli.
- Abiained on DL-pantolaktoon, fenoksüetanool, Amphisol K (heksadetsüülkaaliumvesinikfosfaat), tsetüülalkohol, stearüülalkohol, lanoliin (E 913), isopropüülmüristaat, propüleenglükool (E 1520), puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen kreem välja näeb ja pakendi sisu

Bepanthen kreem on polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubis.

Pakendis on 3,5 g (näidispakend) või 30 g kreemi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja

UAB Bayer
Sporto 18
LT-09238 Vilnius
Leedu

Tootja

GP Grenzach Productions GmbH
Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 12, 11415 Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2020.