

## **B. PAKENDI INFOLEHT**

## PAKENDI INFOLEHT

Pederipra Spray, 20 mg/ml nahasprei, suspensioon.

### 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva, 135.  
17170-Amer (Girona) HISPAAANIA

### 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pederipra Spray, 20 mg/ml nahasprei, suspensioon.

### 3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

#### Toimeaine:

1 ml nahasprei suspensiooni sisaldab:  
Kloortetratsükliini (hüdrokloriidina).....20 mg

#### Abiained:

Patentsinine V (E131)

### 4. NÄIDUSTUS(ED)

Kloortetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete nahainfektsioonide raviks.

Kasutusala: haavad (ka kirurgilised haavad), bakteriaalsed sõrainfektsioonid.

### 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada näopiirkonda.

Mitte lubada loomadel kahjustunud kohta lakkuda 15 minuti jooksul pärast ravimi manustamisest.

Vältida igasugust kontakti kahjustunud pinnaga 5 minuti jooksul pärast ravimi manustamist.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

### 6. KÕRVALTOIMED

Võib esineda lokaalseid nahaärritusi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## **7. LOOMALIIGID**

Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer, kass, kodulinnud.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD**

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi manustamist puhastada kahjustatud ala, eemaldada mustus ja nekrootilised koed.

Pihustada haigestunud alale kuni selle täieliku katmiseni.

Enne ravimi manustamist puhastada kahjustatud ala, eemaldada mustus ja nekrootilised koed.

Vajadusel ravimi manustamist korrata vastavalt kahjustatud piirkonna ja haiguskolde seisundile.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS**

Mitte manustada rohkem kui 2 korda päevas.

## **10. KEELUAJAD**

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Looma hädatapmisel tuleb välistada manustamiskoha sattumine toidutoorme hulka.

Piimale: 0 päeva

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.

Konteiner on rõhu all.

Kaitsta otsese päikesevalguse ja üle 45°C temperatuuri eest.

Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.

## **12. ERIHOIATUSED**

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikroobse ravi printsiipe.

Veterinaarravimi toime kasutamisel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole teada.

Pikaajalise kasutamise korral võib tekkida naha ülitundlikkusreaktsioon mis kaob ravimi kasutamise lõpetamisel.

Mitte manustada loomadele, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes.

Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist. Manustamisel vältida otsest kontakti ravimiga, eriti selle sissehingamist. Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma. Kokkupuute korral pesta rohke veega.

**13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Rõhukonteineri lõhkumine ja põletamine (isegi siis, kui see on tühi) on keelatud.

Mitte pihustada tulle ega hõõgivatele esemetele.

**14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

September 2010

**15. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

## **A. PAKENDI MÄRGISTUS**

**VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

**ETIKETT**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Pederipra Spray, 20 mg/ml nahasprei, suspensioon.

**2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS**

**Toimeaine(d):**

1 ml nahasprei suspensiooni sisaldab:  
Kloortetratsükliini (hüdrokloriidina).....20 mg

**Abiained:**

Patentsinine V (E131)

**3. RAVIMVORM**

Nahasprei, suspensioon.

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

270 ml, sisaldab 63 ml nahasprei, suspensiooni ja 137 ml propellenti.

**5. LOOMALIIGID**

Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer, kass, kodulinnud.

**6. NÄIDUSTUS(ED)**

Kloortetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete nahainfektsioonide raviks.

Kasutusala: haavad (ka kirurgilised haavad), bakteriaalsed sõrainfektsioonid.

**7. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte manustada näopiirkonda.

Mitte lubada loomadel kahjustunud kohta lakkuda 15 minuti jooksul pärast ravimi manustamisest.

Vältida igasugust kontakti kahjustunud pinnaga 5 minuti jooksul pärast ravimi manustamist.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

## **8. KÕRVALTOIMED**

Võib esineda lokaalseid nahaärritusi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

## **9. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD**

Enne kasutamist loksutada.

Enne ravimi manustamist puhastada kahjustatud ala, eemaldada mustus ja nekrootilised koed.

Pihustada haigestunud alale kuni selle täieliku katmiseni.

Vajadusel ravimi manustamist korrata vastavalt kahjustatud piirkonna ja haiguskolde seisundile. Mitte manustada rohkem kui 2 korda päevas.

## **10. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS**

Mitte manustada rohkem kui 2 korda päevas.

## **11. KEELUAJAD**

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva

Looma hädatapmisel tuleb välistada manustamiskoha sattumine toidutoorme hulka.

## **12. ERIHOIATUSED**

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikroobse ravi printsiipe.

Veterinaarravimi toime kasutamisel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole teada.

Pikaajalise kasutamise korral võib tekkida naha ülitundlikkusreaktsioon mis kaob ravimi kasutamise lõpetamisel.

Mitte manustada loomadele, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes.

Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist. Manustamisel vältida otsest kontakti ravimiga, eriti selle sissehingamist. Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma. Kokkupuute korral pesta rohke veega.

## **13. KÕLBLIKUSAEG**

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

## **14. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.  
Konteiner on rõhu all.  
Kaitsta otsese päikesevalguse ja üle 45°C temperatuuri eest.  
Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.

**15. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.  
Rõhukonteineri lõhkumine ja põletamine (isegi siis, kui see on tühi) on keelatud.  
Mitte pihustada tulle ja hõõguvatele esemetele.

**16. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks — Retseptiravim.

**17. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**18. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII  
VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva, 135.  
17170-Amer (Girona) HISPAANIA

**17. MÜÜGILOA NUMBER**

1318

**18. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Partii {number}

**19. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

September 2010

**20. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.