

## **PAKENDI INFOLEHT**

**PAKENDI INFOLEHT**  
**KENOSTART, 3 mg/g nisakastutuslahus piimalehmadele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

CID LINES NV  
Waterpoortstraat, 2  
8900 IEPEER  
Belgia

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

KENOSTART, 3 mg/g nisakastutuslahus piimalehmadele  
Aktiivne jood

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

Aktiivne jood                                 3 mg/g

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Nisade desinfektsioon veiste mastiidi ennetusravi osana.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust joodi või ravimi ükskõik millise aine suhtes.

**6. KÕRVALTOIMED**

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsisemaid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitada sellest oma veterinaararsti.

**7. LOOMALIIGID**

Veis (piimalehmad).

**8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Preparaat on saadaval kasutamiskõlblikus lahuse kujul. Kasutusnõu peaks mahutama vähemalt 5 ml ravimit. Kasutada iga nisa vahetult pärast lüpsmist. Veenduda, et nisast kattuks ühtlaselt vähemalt kolmveerand pikkusest. Kasutusnõu täita vastavalt vajadusele. Kasutamise järel tuleks nõu tühjendada ning uuesti kasutamise eel pesta. Veterinaarravim on mõeldud nisade lüpsijärgseks kasutamiseks kuni kaks korda päevas.

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt. lõik 8.

## 10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva

Piimale: 0 päeva

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

Hoida konteiner tihedalt suletuna

Mitte lasta külmuda.

Kui preparaat on külmunud, sulatada soojas ruumis ja enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP.

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 16 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.

## 12. ERIHOIATUSED

### **Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:**

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi kasutamine nisavigastuste korral võib aeglustada haavade paranemist. Nisavigastuste korral on soovitatav ravimit mitte manustada kuni vigastused on paranenud.

### **Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:**

Vältida silma sattumist. Ravimi silma sattumisel loputada puhta voolava veega ning pöörduda arsti poole.

Ravimi allaneelamisel juua suures koguses vett ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Hoida eemal toidust ja loomasöödast.

Pärast kasutamist pesta käed.

Inimesed, kes on joodi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

### **Tiinus, laktatsioon:**

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni perioodil.

### **Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:**

Mitte segada teiste kemikaalidega.

### **Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):**

Ei rakendata. See veterinaarravim on mõeldud paikseks kasutamiseks, märkimisväärset imendumist ei toimu.

### **Sobimatus:**

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Kenostart ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

Küsi palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Märts 2013

### **15. LISAINFO**

Pakendid: 1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 200L.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.