

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Trachilid 8 mg losengid Lidokaiinvesinikkloriid

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma Trachilid'i täpselt juhistelevastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui pärast 3 päeva möödumist haigusnähud süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Trachilid ja milleks seda kasutatakse.
2. Mida on vaja teada enne Trachilid'i kasutamist
3. Kuidas Trachilid'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Trachilid'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Trachilid ja milleks seda kasutatakse

Need losengid kuuluvad ravimite rühma, mis leevendavad kurguvalu (lokaalanesteetikumid). Lokaalanesteetikumide kasutamine vähendab kurgu valulikkust.

Trachilid'i kasutatakse lühiajalise lokaalse kurguvalu raviks, mis on tingitud mittemädasest kurguhaigusest.

2. Mida on vaja teada enne Trachilid'i kasutamist

Ärge kasutage Trachilid'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) lidokaiinvesinikkloriidi, teiste amiid-tüüpi lokaalanesteetikumide või Trachilid'i mõne koostisosa suhtes;
- alla 12-aastased lapsed ei tohi Trachilid'i kasutada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Trachilid

- Kui teil on tugevalt põletikuline kurk või kurguvalu koos palaviku, peavalu, iivelduse või oksendamisega. Nendel juhtudel ei tohi Trachilid'i võtta üle kahe päeva, ilma arstiga nõu pidamata, et ennetada võimalikke tüsistusi.
- Tugevalt kahjustatud ja/või põletikulise suu või neelu limaskestast kahjustusega patsientidel võib toimeaine imenduda suuremas koguses. See on oluline eelkõige südame-veresoonkonna haiguste või ka suurenenud krambivalmidusega patsientidel.
- Kahjustunud maksa- ja/või neerutalitlusega patsientidel, sest need seisundid võivad suurendada toimeaine sisaldust veres.
- Kui te teate, et olete allergiline teistele amiid-tüüpi lokaalanesteetikumidele, sest sellisel juhul võite olla allergiline ka lidokaiinile.

Lapsed ja noorukid

Alla 12-aastased lapsed ei tohi Trachilid'i kasutada (vt eespool).

Trachilid'i kasutamise efektiivsuse ja talutavuse kohta lastel ja noorukitel on ebapiisavalt andmeid. Seetõttu ei soovitata noorukitel vanuses 12...17 aastat Trachilid'i kasutada.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Trachilid võtmine koos toidu ja joogiga

Lokaalanesteetikumid võivad kahjustada neelamisfunktsiooni ja suurendada aspiratsiooni ohtu, eriti väikestel lastel. Te tohi süüa ega juua vahetult pärast Trachilid'i kasutamist, et vältida aspiratsiooni või hammustustraumasid.

Olge ettevaatlikud kuumade toitude ja jookidega. Alanenud kuumatundlikkuse tõttu on suurenenud ka võimalus tekitada suu ja kurgu limaskestast põletusi kuumade jookide ja toitudega. Korduv kasutamine võib põhjustada kurgu tundetust ja seetõttu neelamisraskusi.

Rasedus

Raseduse ajal ei tohi Trachilid'i kasutada, välja arvatud, kui teie arst peab seda hädavajalikuks.

Imetamine

Lidokaiin imendub ema rinnapiima niivõrd väikestes kogustes, et Trachilid'i ettenähtud annustes kasutades on ravimi kahjulik toime rinnapiimaga toidetavale imikule väga ebatõenäoline.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Trachilid ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

Oluline teave mõningate Trachilid koostisainete suhtes

Trachilid sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas Trachilid'i kasutada

Võtke Trachilid'i alati täpselt nii, nagu selles infolehes kirjeldatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanutele üks loseng vähemalt iga kahe tunni järel. Ärge võtke päevas rohkem kui kuus losengi. Laske Trachilid losengil aeglaselt suus imenduda.

Kui kaua peate Trachilid'i kasutama?

Ärge tarvitage Trachilid'i kauem kui kolm päeva ilma arstiga konsulteerimata.

Kui teil on tunne, et Trachilid'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Trachilid'i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust arsti või apteekriga.

Väga suure hulga Trachilid'i võtmisel võib tekkida lidokaiini üleannustamine, mis tekitab järgmisi sümptomeid: haigutamine, rahutus, pearinglus, iiveldus või oksendamine, düsartria (närvisüsteemiga seotud kõnehäire), kuulmis- ja nägemishäired ja ka liigutuste koordinatsioonihäired. Keskmise raskusega lidokaiini üleannus võib põhjustada lihastõmbulusi, krampe, teadvusetust, hingamise pärssumist ja koomat, kusjuures raske üleannus võib tekitada hüpotensiooni ja vereringe kollapsi.

Kui te unustate Trachilid'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui loseng jäi eelmisel korral võtmata.

Jätkake losengide võtmist eespool kirjeldatud moel (mitte üle ühe losengi iga kahe tunni järel ja kuni 6 losengi päevas).

Kui te lõpetate Trachilid'i võtmise

Toime ei ole teada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Trachilid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on määratletud järgmiste esinemissageduste alusel:

Väga sage:	rohkem kui 1 kasutajal 10st
Sage:	1 kuni 10 kasutajal 100st
Aeg-ajalt:	1 kuni 10 kasutajal 1000st
Harv:	1 kuni 10 kasutajal 10 000st
Väga harv:	vähem kui 1 kasutajal 10 000st
Teadmata:	sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Harv:

- soovitud valuvaigistava toime tõttu võib muutuda maitsemeel või tekkida keele tundetus. Need toimed kaovad tavaliselt lühikese aja jooksul.

Väga harv:

- ülitundlikkusreaktsioonid või suu muutumine tundlikuks
- sorbitooli sisaldusest põhjustatud lahtistav toime

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest

5. Kuidas Trachilid'i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Trachilid'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil pärast EXP / Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trachilid sisaldab

- Toimeaine on lidokaiinvesinikkloriid. Iga loseng sisaldab 8 mg lidokaiinvesinikkloriidi (monohüdraadina).
- Abiained on sorbitool, veevaba sidrunhape, sukaadisidruni maitseaine, sidrunimahla maitseaine, atsesulfaamkaalium, magneesiumstearaat.

Kuidas Trachilid välja näeb ja pakendi sisu

Trachilid losengid on valged, ümarad, lamedad, kaldservadega imemistabletid.

Trachilid on saadaval pakendis, milles on 2, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60 või 100 losengi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Saksamaa
E-mail: info@engelhard-am.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
A/S Sirowa Tallinn,
Salve 2 c,
EE-11612 Tallinn

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Küpros:	Trachilid
Tšehhi Vabariik:	Trachisan 8 mg proti bolesti v krku
Eesti:	Trachilid
Kreeka:	Trachilid
Poola:	Trachisan 8 mg
Läti:	Trachilid
Leedu:	Trachilid
Sloveenia:	Trachisan 8 mg pastile
Holland:	Trachisan 8 mg

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015.