

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Altresyn, 4 mg/ml suukaudne lahus sigadele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja:  
Ceva Santé Animale  
10 av. de La Ballastière  
33500 Libourne  
Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:  
Ceva Santé Animale  
Z.I. Très le Bois  
22603 Loudéac  
Prantsusmaa

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Altresyn, 4 mg/ml suukaudne lahus sigadele  
Altrenogest

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

1 ml sisaldab altrenogesti 4 mg, butüülhüdrosüanisooli (E320) 0,07 mg ja butüülhüdrosütolueeni (E321) 0,07 mg.  
Selge, kahvatukollane, lõhnatu lahus.

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Östruse sünkroniseerimiseks suguküpsedel emistel.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte manustada emakapõletikuga loomadele.  
Mitte manustada isasloomadele.  
Vt lõik „Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil“.

**6. KÕRVALTOIMED**

Ei ole teada.  
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## **7. LOOMALIIGID**

Siga (suguküpsed emised).

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Suukaudseks manustamiseks sööda pinnale kantuna.

20 mg altrenogesti looma kohta, s.o 5 ml looma kohta üks kord päevas, 18 järjestikusel päeval.

Tagada, et manustataks korrektne päevane annus, sest alaannustamine võib põhjustada munasarja tsüstide moodustumist.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Ühe 5 ml annuse manustamiseks vajutada ja vabastada mõõtepump.

Loomad tuleb eraldada ja annustada individuaalselt.

Ravim tuleb lisada sööda pinnale mõõtepumba vahendusel vahetult enne loomade söötmist.

Mitte loksutada enne kasutamist, et vältida ravimi segunemist rõhu all olevasse mahutisse lisatud lämmastikuga.

## **10. KEELUAEG**

Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Rõhu all olev mahuti: hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult, temperatuuril mitte üle 50 °C. Mitte purustada ega põletada mahutit, isegi mitte pärast tühjaks saamist.

## **12. ERIHOIATUSED**

Mitte manustada isasloomadele.

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Lisada veterinaarravim söödale vahetult enne söötmist. Söömata jäänud ravimsööt hävitada.

Kasutada ainult suguküpsedel emistel, kelle on üks östrus juba olnud.

Osaliselt tarbitud sööt tuleb ohutult ära visata ja mitte anda teistele loomadele.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomade manustavale isikule

Hoiduda ravimi otsesest kokkupuutest nahaga. Preparaati käsitsedes tuleb kanda personaalset kaitseriietust (kindad ja üleriietus).

Poorsed kindad võivad ravimit nahani läbi lasta. Kui ravim puutub kinda all nahaga kokku, võivad oklusiivsed materjalid, nagu lateks- või kummikindad, suurendada ravimi transkutaanset imendumist. Juhuslikul ravimi silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega.

Pesta käsi pärast selle preparaadiga ravi läbiviimist ja enne söögikordi.

Rasedad ja fertiilses eas naised peavad hoiduma kokkupuutest selle ravimiga või olema ravimi käsitsemisel äärmiselt ettevaatlikud.

Inimesed, kellel esineb progesteron-sõltuvaid kasvajaid (teadaolevaid või eeldatavaid) või trombembolilisi häireid, ei tohi ravimit käsitseda.

Ravimiga kokkupuutumisel tekkivad toimed: juhuslik imendumine võib viia menstruatsioonitsükli katkemiseni, emaka või alakõhu krampideni, emakaverejooksu suurenemise või vähenemiseni, raseduse pikenemiseni või peavaluden. Hoiduda ravimi otsesest kokkupuutest nahaga. Ravimiga kokkupuutumisel pöörduda abi saamiseks arsti poole.

#### Tiinus ja laktatsioon

Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

#### Koostoimed, üleannustamine, sobimatus

Ei ole teada.

#### Teised keskkonnamõjuga seotud ettevaatusabinõud

Ravitud loomade sõnniku laotamisel peab rangelt kinni pidama riiklike või kohalike eeskirjadega määratud minimaalsest kaugusest pinnaveest, sest sõnnik võib sisaldada altrenogesti, mis võib vesikeskkonnale kahjulikult mõjuda.

### **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Altresyn ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

### **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Aprill 2019

### **15. LISAINFO**

Pakendi suurused:

Pappkarp ühe 360 ml mahutiga.  
Pappkarp kolme 360 ml mahutiga.  
540 ml mahuti.  
1080 ml mahuti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.