

PAKENDI INFOLEHT
Feligen CRP, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti kassidele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Virbac S.A.
1ère avenue - 2065 m L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Feligen CRP, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti kassidele.

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks annus süstesuspensiooni sisaldab:

Toimeained

Lüofilisaat

Kasside elus kalitsiviirus (tüvi F9) $10^{4,6} \dots 10^{6,1}$ CCID₅₀ *

Kasside viirusliku rinotrahheiidi elusviirus (tüvi F2) $10^{5,0} \dots 10^{6,6}$ CCID₅₀

Kasside panleukopeenia elusviirus (tüvi LR 72) $10^{3,7} \dots 10^{4,5}$ CCID₅₀

*50% rakukultuure nakatav annus

Abiained:

Kaaliumhüdrosiid, laktoosmonohüdraat, glutamiinhape, kaaliumdivesinikfosfaat, dikaaliumfosfaat, želatiin, süstevesi

Lahusti

Süstevesi 1,2 ml

4. NÄIDUSTUS(ED)

Kasside aktiivseks immuniseerimiseks alates 8 nädala vanusest:

- kasside kalitsiviroosi vastu kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise vähendamiseks;
- kasside viirusliku rinotrahheiidi vastu kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise vähendamiseks;
- kasside panleukopeenia vastu leukopeenia vältimiseks ja kliiniliste tunnuste vähendamiseks.

Tõestatud on, et immuunsus panleukopeenia suhtes tekib kolm nädalat pärast esmast vaksineerimist ning kalitsiviroosi ja rinotrahheiidi suhtes neli nädalat pärast esmast vaksineerimist.

Immuunsus kõikide vaktsiini komponentide suhtes kestab üks aasta pärast esmast vaksineerimist.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

6. KÕRVALTOIMED

24 tunni jooksul pärast vaksineerimist võib täheldada mööduvat kehatemperatuuri tõusu ja apaatiat. Süstekohal võib 6...9 päeva pärast vaksineerimist täheldada piiratud ja mööduvat sõlmekest. See reaktsioon möödub iseenesest kõige rohkem 4 nädala jooksul. Mõnedel loomadel on vaksineerimisejärgsetel päevadel täheldatud kerget pisaravoolu, see möödub iseenesest mõne päeva jooksul.

Väga harvadel juhtudel võib loomadel tekkida anafülaktiline šokk, mille korral tuleb rakendada sobivat sümptomaatilist ravi.

Ohutusuringutes täheldati väga sageli mõningaid mööduvaid vaksineerimisjärgseid seedehäireid. Ohutusuringutes täheldati sageli kerget ja mööduvat turset vaksineerimisjärgsetel päevadel, mis kaob 2 päeva jooksul.

Ohutusuringutes täheldati sageli mõningaid mööduvaid ja isetaanduvaid vaksineerimisjärgseid nähte, nagu kerge hüpertermia ja letargia.

Spontaansete teadete kohaselt on ülitundlikkusreaktsioone (nt oksendamine, kõhulahtisus, düspnoe, allergiline turse) esinenud väga harva.

Allergilise või anafülaktilise reaktsiooni korral tuleb rakendada sobivat sümptomaatilist ravi.

Kirjanduse andmetel võib kassipoegadel väga harva esineda palaviku- lonkamise sündroomi (*febrile limping syndrome*) reaktsioone pärast mistahes kasside kalitsiviiruse komponenti sisaldava vaktsiini kasutamist.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud).

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Kass.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Subkutaanseks manustamiseks.

Segada lüofilisaat lahustiga ja loksutada viaali õrnalt.

Manustada üks annus Feligen CRP-d järgneva vaksineerimiskeemi kohaselt.

Esmane vaksineerimine

Esimene annus Feligen CRP süst kassipoegadele alates 8 nädala vanusest.

Teine annus Feligen CRP süst 3 või 4 nädalat hiljem (alates 12 nädala vanusest).

Maternaalsed antikehad võivad immuunreaktsiooni vaksineerimisele negatiivselt mõjutada.

Maternaalsete antikehade arvatava esinemise korral võib olla vajalik kolmas vaktsiinisisüst pärast 15 nädala vanuseks saamist.

Kordusvaksineerimine

Iga-aastane kordusvaktsineerimine Feligen CRP-ga.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik 8 „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja -meetod“.

10. KEELUAEG

Ei rakendata.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: kohe kasutamiseks.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Maternaalsed antikehad, eriti kasside panleukopeenia viiruse vastased maternaalsed antikehad, võivad immuunreaktsiooni vaktsineerimisele negatiivselt mõjutada.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vaktsineerida ainult terveid loomi.

Soovitav on manustada loomadele vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist siseparasiitide vastaseid ravimeid.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil

Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste vaktsiinidega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Muid kõrvaltoimeid peale nende, mida on kirjeldatud lõigus 6. Kõrvaltoimed ei ole täheldatud.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2018

15. LISAINFO

10 ja 50 annust pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaaravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru
Uusaru 5
Saue 76505
Eesti
Tel: 800 9000