

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Dehinel Plus Flavour, tabletid koertele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja:

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Sloveenia

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevcva 20/E, 10450 Jastrebarsko, Horvaatia  
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia  
Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Prantsusmaa

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Dehinel Plus Flavour, tabletid koertele  
prasikvanteel, püranteelembonaat, febanteel

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

Üks tablett sisaldab:

Prasikvanteel	50 mg
Püranteelembonaat	144 mg
Febanteel	150 mg

Kollased, ümmargused, kaksikkumerad tabletid nähtavate tumedamate laikudega, poolitusjoonega ühel küljel.

Tablette saab jagada kaheks või neljaks võrdseks osaks.

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Järgmiste ümarusside ja paelusside seganakkuste raviks täiskasvanud koertel ja kutsikatel:

Ümarussid

Solkmed: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (vanemad noorvormid ja täiskasvanud)

Kõõrpead: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (täiskasvanud)

Paelussid

Paelussid: *Taenia* spp, *Dipylidium caninum*

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada samaaegselt piperasiini sisaldavate preparaatidega.

Tiinete koerte ravimisel mitte ületada soovitatud annust.

Mitte kasutada loomadel, kellel esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Mitte kasutada alla 2 nädala vanustel ja/või alla 2 kg kaaluvatel koertel.

## **6. KÕRVALTOIMED**

Harvadel juhtudel võib mõnedel kutsikatel esineda mööduvat vedelat väljaheidet, kõhulahtisust ja/või oksendamist. Väga harvadel juhtudel võib täiskasvanud koertel esineda oksendamist koos kõhulahtisusega või ilma.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaaravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## **7. LOOMALIIGID**

Koer (väikesed ja keskmise suurusega).

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

Suukaudseks manustamiseks.

Soovitavad annused on: febanteeli 15 mg 1 kg kehamassi kohta, püranteeli 14,4 mg 1 kg kehamassi kohta ja prasikvanteeli 5 mg 1 kg kehamassi kohta. See vastab 1 tabletile 10 kg kehamassi kohta.

Tablette saab poolitada/veerandikeks jagada, et võimaldada täpset annustamist.

Tablette saab anda otse koerale suhu või koos toiduga. Enne ega pärast preparaadi manustamist ei ole vajalik juurdepääsu piiramine toidule.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Korrekse annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.

Kutsikatel võib antud ussivastast preparaati kasutada alates 2 nädala vanusest ja iga 2 nädala tagant kuni 12 nädala vanuseni. Seejärel peavad nad saama ravi 3-kuuliste intervallidega. Emakoerale on soovitatav manustada ravimit samal ajal kui kutsikatele.

*Toxocara* nakkuse kontrolli all hoidmiseks peab imetavatele koertele preparaati manustama 2 nädalat pärast poegimist ja seejärel iga 2 nädala tagant kuni võõrutamiseni.

Rutiinseks raviks soovitatakse ühekordset annust 3-kuuliste intervallidega. Raskekujulise ümarussnakkuse korral tuleb ravi korrata 14 päeva möödudes.

## **10. KEELUAEG**

Ei rakendata.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Veterinaaravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“.  
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## **12. ERIHOIATUSED**

### Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kirbud on ühe levinud paelussiliigi - *Dipylidium caninum* - vaheperemeesteks. Kui vaheperemeeste, nt nagu kirbud, hiired jne tõrjet ei tehta, on suur tõenäosus paelussiga uuesti nakatumiseks.

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Osaliselt kasutatud tabletid tuleb hävitada.

Mitte kasutada alla 2 nädala vanustel ja/või alla 2 kg kaaluvatel koertel

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Hea hügieeni tagamiseks peavad loomale tabletti andvad või tabletti koeratoidule lisavad isikud toimingut järgselt käsi pesema.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

### Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Enne tiinetel koertel ümarusside vastase ravi alustamist konsulteerida loomaarstiga.

Preparaati võib kasutada laktatsiooni perioodil.

Tiinuse esimese kahe kolmandiku jooksul mitte kasutada.

### Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte kasutada samaaegselt piperasiiniga, kuna püranteeli ja piperasiini (kasutusel paljudes ussivastastes preparaatides koertele) anthelmintilised toimed võivad antagoniseeruda.

Samaaegne kasutamine koos teiste kolinergiliste ühenditega võib põhjustada mürgistust.

### Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Bensimidazoolide terapeutiline laius on suhteliselt suur. Püranteel ei imendu süsteemselt mitte mingil määral. Prasikvanteeli terapeutiline laius on samuti suhteliselt suur, olles kuni viis korda suurem soovitatavast annusest.

## **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsi palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Juuli 2020

## **15. LISAINFO**

Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 2 tabletti (1 blister 2 tabletiga) karbis.

Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 4 tabletti (2 blisterit 2 tabletiga) karbis.

Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 10 tabletti (1 blister 10 tabletiga) karbis.

Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 30 tabletti (3 blisterit 10 tabletiga) karbis.

Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 50 tabletti (5 blisterit 10 tabletiga) karbis.

Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 100 tabletti (10 blisterit 10 tabletiga) karbis.  
Trükitud ja perforeeritud Alu-Alu blister: 300 tabletti (30 blisterit 10 tabletiga) karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal  
Pärnu mnt 141  
11314 Tallinn  
Tel. 6671658

\*Kehtib 100 tabletiga pakendile

1 tablett 10 kg kohta

ASUTUSE PITSAT

Looma omaniku nimi: .....

.....

Lemmiklooma nimi: .....

.....

Annus: .....

.....