

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Moviprep, suukaudse lahuse pulber

Makrogool 3350, veevaba naatriumsulfaat, naatriumkloriid, kaaliumkloriid, askorbiinhape ja naatriumaskorbaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Moviprep ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Moviprep'i võtmist
3. Kuidas Moviprep'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Moviprep'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Moviprep ja milleks seda kasutatakse

Moviprep on neljas kotikeses olev sidrunilõhnaline lahtisti. Pakendis on kaks suuremat kotikest (kotike A) ja kaks väiksemat kotikest (kotike B). Neid kõiki vajate üheks ravikorraks.

Moviprep on mõeldud täiskasvanute soolestiku puhastamiseks enne läbivaatust.

Moviprep toimib soolesisaldist vedeldades ja soolestikku tühjendades.

2. Mida on vaja teada enne Moviprep'i võtmist

Moviprep'i ei tohi kasutada:

- kui olete selle ravimi toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
- kui teil on soolesulgus,
- kui teil on sooleseina mulgustus,
- kui teil on soolestiku tühjendamise häire,
- kui teil on soole halvatus (mis tekib sageli pärast kõhuoperatsiooni),
- kui teil on fenüülketonuuria. See on organismi pärilik puue, mis seisneb organismi võimetuses kasutada üht teatavat aminohapet. Moviprep sisaldab üht fenüülalaniini allikat,
- kui teie organism ei suuda toota piisavalt glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi,
- kui teil on toksiline megakoolon (ägeda koliidi raske komplikatsioon).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie tervislik seisund on nõrk või põete rasket haigust, peate pöörama erilist tähelepanu lõigus 4 nimetatud kõrvaltoimetele. Kui teil tekib mõni mure, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Enne Moviprep'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esineb ükskõik milline järgnev seisund:

- te peate vedelikke nende turvaliseks allaneelamiseks tahkendamata;
- teil on kalduvus allaneelatud joogi või toidu või maohappe tagasiheiteks;
- neeruhaigus;

- südamepuudulikkus või südamehaigus, sh kõrgvererõhutõbi, südame rütmihäired või südamepekslemine (palpitatsioonid);
- kilpnäärmehaigus;
- dehüdratsioon (vedelikupuudus organismis);
- põletikulise soolehaiguse ägenemine (Crohni tõbi või haavandiline jämesoolepõletik).

Moviprep'i ei tohi anda ilma meditsiinilise järelevalveta teadvushäirega patsientidele.

Lapsed ja noorukid

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi Moviprep'i kasutada.

Muud ravimid ja Moviprep

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate teisi ravimeid, siis võtke neid vähemalt üks tund enne või pärast Moviprep'i võtmist, sest muidu võidakse need teie seedesüsteemist välja uhtuda ja nende mõju väheneb.

Moviprep koos toidu ja joogiga

Moviprep'i võtmise alustamisest kuni läbivaatuse lõpuni ärge sööge mingit tahket toitu.

Moviprep'i kasutamise ajal jätkake vedeliku tarvitamist tavapärasel kogusel. Moviprep'is olev vedelik ei asenda tavapäraselt vedeliku kasutamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Moviprep'i kasutamise kohta raseduse või imetamise ajal puuduvad andmed ja seda peaks kasutama ainult juhul, kui arst peab seda hädavajalikuks. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Moviprep ei mõjuta teie võimet autot juhtida või masinatega töötada.

Moviprep sisaldab naatriumi, kaaliumi ja fenüülalaniini allikat

See ravimpreparaat sisaldab 8,4 g naatriumit (söögisoola peamine koostisosa) ühe ravikorra kohta (üheks ravikorraks kulub kaks liitrit Moviprepi lahust). See on võrdne 420%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisaldusega dieedil olevate patsientide puhul. Ainult osa naatriumist (2,6 g ravikorra kohta) imendub.

See ravimpreparaat sisaldab 1,1 g kaaliumit ühe ravikorra kohta. Üheks ravikorraks kulub kaks liitrit Moviprepi lahust. Sellega tuleb arvestada neerutalitluse häirega või kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriat põdevatele inimestele.

3. Kuidas Moviprep'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 2 liitrit lahust, mida valmistatakse järgmiselt.

Igas pakis on 2 läbipaistvat kotti, millest kumbki sisaldab üht kaksikkotikest: kotikest A ja kotikest B. Iga kaksikkotike (A ja B) on ette nähtud lahustamiseks ühes liitris vees. Järelikult piisab sellest pakist kuni 2 liitri Moviprep'i lahuse valmistamiseks.

Enne Moviprep'i võtmist lugege palun hoolikalt järgmisi juhiseid. Te peate teadma:

- Millal Moviprep'i võtta?

- Kuidas Moviprep'i valmistada?
- Kuidas Moviprep'i juua?
- Mis juhtub?

Millal Moviprep'i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Teie ravi Moviprep'iga peab olema lõpetatud enne läbivaatust:

Selle ravikuuri võib manustada kas jagatuna või ühekordse annusena alljärgnevalt:

Protseduurid, mille ajal te magate (kasutatakse üldanesteesiati):

1. Jagatud annus: 1 liiter Moviprep'i läbivaatusele eelneval õhtul ja 1 liiter Moviprep'i läbivaatuse päeva varahommikul. Moviprep'i ning mistahes muu selge vedeliku kasutamine tuleb lõpetada vähemalt kaks tundi enne läbivaatuse algust.
2. Ühekordne annus: kaks liitrit Moviprep'i läbivaatusele eelneval õhtul või kaks liitrit Moviprep'i läbivaatuse päeva hommikul. Moviprep'i ning mistahes muu selge vedeliku kasutamine tuleb lõpetada vähemalt kaks tundi enne läbivaatuse algust.


Protseduurid, mille ajal teid ei panda magama (ilma üldanesteesiati kasutamata):

1. Jagatud annus: 1 liiter Moviprep'i läbivaatusele eelneval õhtul ja 1 liiter Moviprep'i läbivaatuse päeva varahommikul. Moviprep'i ning mistahes muu selge vedeliku kasutamine tuleb lõpetada vähemalt üks tund enne läbivaatuse algust.
2. Ühekordne annus: kaks liitrit Moviprep'i läbivaatusele eelneval õhtul või kaks liitrit Moviprep'i läbivaatuse päeva hommikul. Moviprep'i kasutamine tuleb lõpetada vähemalt kaks tundi enne läbivaatuse algust. Mistahes muu selge vedeliku kasutamine tuleb lõpetada vähemalt üks tund enne läbivaatuse algust.

Tähtis: Moviprep'i võtmise alustamisest kuni läbivaatuse lõpuni ärge sööge mingit tahket toitu.

Kuidas Moviprep'i valmistada

- Avage üks läbipaistev kott ja võtke sellest välja kotikesed A ja B.
- Lisage MÖLEMA, A- ja B-kotikese sisu mõõtekannu, mille mahtuvus on 1 liiter.
- Valage anumasse vett kuni 1 liitri märgini ja segage, kuni kogu pulber on lahustunud ning Moviprep'i lahus on selge või kergelt hägune. Selleks võib kuluda kuni 5 minutit.



Kuidas Moviprep'i juua

Jooge esimene liiter Moviprep'i lahust ühe kuni kahe tunni jooksul. Püüdke juua klaasitäis iga 10...15 minuti järel.

Kui olete selle koguse ära joonud, valmistage ja jooge teine liiter Moviprep'i lahust, milleks kasutate A- ja B-kotikest järelejäänud pakendist.

Selle ravikuuri käigus soovitatakse teil juua veel üks liiter *selget* vedelikku, et vältida janutunnet ja dehüdratsiooni tekkimist. Vesi, selge supp, puuviljamahl (*ilma viljalihata*), karastusjookid, tee või kohv (*ilma piimata*) - need kõik sobivad. Neid jooke võib tarvitada hiljemalt kuni kaks tundi enne üldanesteesiaga läbivaatust ja kuni üks tund enne läbivaatust ilma üldanesteesiata.

Mis juhtub

Kui alustate Moviprep'i lahuse joomist, on tähtis, et oleksite tualettruumi lähedal. Ühel hetkel hakkate tundma, et soolesisaldis on muutunud vesiseks, ja vajadust soolestikku tühjendada. See on täiesti normaalne ja näitab, et Moviprep'i lahus toimib. Vajadus soolestikku tühjendada lõpeb varsti pärast seda, kui olete joomise lõpetanud.

Kui järgite neid juhiseid, puhastate oma soolestiku ja see aitab kaasa edukale läbivaatusele. Kandke hoolt et teil oleks pärast viimase annuse manustamist piisavalt aega kolonoskoopia osakonda jõudmiseks.

Kui te võtate Moviprep'i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Moviprep'i rohkem kui ette nähtud, võib teil tekkida raske kõhulahtisus, mis võib põhjustada dehüdratsiooni. Jooge rohkelt vedelikku, eriti puuviljamahlu. Kui tunnete muret, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Moviprep'i võtta

Kui te unustate Moviprep'i võtta, võtke annus niipea, kui see teile meenub.

Kui see on mitu tundi pärast õiget aega, võtke ühendust ja pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui võtsite Moviprep'i jagatud annusena, on oluline, et te lõpetate Moviprep'i võtmise vähemalt üks tund enne läbivaatust (ilma üldanesteesiat kasutamata) või kaks tundi enne läbivaatust (kui läbivaatus toimub üldanesteesias). Kui võtsite kogu Moviprep'i hommikul enne läbivaatust ühekordse annusena, on oluline, et te lõpetate Moviprep'i võtmise vähemalt kaks tundi enne läbivaatust..

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Moviprep põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui võtate Moviprep'i, on kõhulahtisuse tekkimine normaalne.

Lõpetage ravimi kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga, kui täheldate ükskõik millist järgmistest kõrvaltoimetest:

- nahalööve või sügelus
- näo, pahklude või teiste kehaosade turse
- südamepekslemine
- äärmine väsimus
- õhupuudus.

Need on raske allergilise reaktsiooni tunnused.

Kui te ei ole 6 tunni jooksul pärast Moviprep'i võtmist soolestikku tühjendanud, katkestage ravimi võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Muud kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel kasutajal 10-st):

kõhuvalu, kõhu paisumine, väsimus, üldine halb enesetunne, päraaku valulikkus, iiveldus ja palavik.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

näljatunne, unehäired, pearinglus, peavalu, oksendamine, seedehäired, janu ja külmavärinad.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

ebamugavustunne, neelamisraskused ja muutused maksafunktsiooni analüüside tulemustes.

Järgmisi kõrvaltoimeid on mõnikord märgatud, aga ei ole teada, kui sageli need esinevad, sest esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel: kõhupuhitus (kõhugaasid), ajutine vererõhu tõus, südame rütmihäired või südamepekslemine (palpitatsioonid), dehüdratsioon, öökimine (püüd oksendada), väga madal vere naatriumisaldus, mis võib põhjustada krampe ja muutused vere

soolade tasemes, nagu bikarbonaatide sisalduse langus, kaltsiumi sisalduse tõus või langus, kloriidide sisalduse tõus või langus ning fosfaadi sisalduse langus. Väheneda võib ka vere kaaliumi- ja naatriumisaldus.

Need reaktsioonid esinevad tavaliselt ainult ravi kestel. Kui need jäävad püsima, pidage nõu oma arstiga.

Esineda võib allergilisi reaktsioone, mille tunnuseks on nahalööve, sügelus, nahapunetus või nõgeslööve, käte, jalgade või pahklude turse, peavalu, südamepekslemine ja õhupuudus.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Moviprep'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast kuupäeva PP.KK.AAAA. Erinevatel kotikestel võib olla erinev kõlblikkusaeg. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Moviprep'i kotikesed: hoida temperatuuril kuni 25 °C (toatemperatuur).

Moviprep'i valmislahus: hoida temperatuuril kuni 25 °C (toatemperatuur). Lahus tuleb hoida kaetuna. Lahust võib hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Ärge säilitage valmislahust üle 24 tunni.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Moviprep sisaldab

Kotike A sisaldab järgmisi toimeaineid:

makrogool (ehk polüetüleenglükool) 3350	100 g
veevaba naatriumsulfaat	7,5 g
naatriumkloriid	2,691 g
kaaliumkloriid	1,015 g

Kotike B sisaldab järgmisi toimeaineid:

askorbiinhape	4,7 g
naatriumaskorbaat	5,9 g

Elektrolüütiliste ionide kontsentratsioon ühes liitris lahuses, mille valmistamiseks on kasutatud mõlemat pakikest, on järgmine:

naatrium	181,6 mmol/l (millest ei imendu rohkem kui 56,2 mmol)
kloriid	59,8 mmol/l
sulfaat	52,8 mmol/l
kaalium	14,2 mmol/l
askorbaat	29,8 mmol/l

Teised koostisosad on:

sidruni lõhnaaine (sisaldab maltodekstriini, tsitraali, sidruniõli, laimiõli, ksantaankummi, E-vitamiini), magusained aspartaam (E951) ja kaaliumatsesulfaam (E950).

Kuidas Moviprep välja näeb ja pakendi sisu

Igas pakis on 2 läbipaistvat kotti, millest kumbki sisaldab üht kaksikkotikest: kotikest A ja kotikest B. Iga kaksikkotike (A ja B) on ette nähtud lahustamiseks ühes liitris vees.

Moviprep on pakendites, mis sisaldavad 1, 10, 40, 80, 160 ja 320 ühekordse ravi pakki. Haiglapakend, milles on 40 ühekordse ravi pakki. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083HP Amsterdam
Holland

Tootja:

Norgine Limited
New Road, Hengoed
Mid Glamorgan, CF82 8SJ
Ühendkuningriik

või

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.
Damastown Mulhuddart
Dublin 15
Iirimaa

või

Norgine BV
Antonio Vivaldistraat 150
1083HP Amsterdam
Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel. +372 6827400

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Ühendkuningriik: Moviprep.
Rootsi: Movprep

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2020.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Moviprep'i tuleb manustada ettevaatusega nõrga tervisega hapra kehaehitusega patsientidele või patsientidele, kellel on järgmised tõsised seisundid:

- okserefleksi häired või kalduvus toidu hingamisteedesse tõmbamiseks või tagasiheitiks
- teadvuse häired
- raske neerupuudulikkus (kreatiini kliirens < 30 ml/min)
- südamepuudulikkus (NYHA III või IV klass)

- südame rütmihäirete riskiga patsiendid, nt südame- ja veresoonekonna ravimeid tarvitavad või kilpnäärmehaigusega patsiendid
- dehüdratsioon
- raske äge põletikuline soolehaigus.

Enne Moviprep'i kasutamist tuleb dehüdratsiooniseisund või elektrolüütide nihked korrigeerida.

Pooleldi teadvusetuid patsiente või patsiente, kellel on kalduvus toidu hingamisteedesse tõmbamiseks või tagasiheitteks, peab ravimi manustamise ajal hoolega jälgima, eriti kui see toimub nasogastraalselt.

Moviprep'i ei tohi manustada teadvusetutele patsientidele.