

PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Konteiner

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Kenocidin Spray and Dip

Kloorheksidiindiglükonaat 5 mg/ml, nisakastutuslahus/nisaspri veistele (piimakari)

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Kloorheksidiindiglükonaat: 5,00 mg/ml (mis vastab kloorheksidiinile 2,815 mg/ml)

Briljantsinine 85% (E133): 0,035 mg/ml

Glütserool: 60,00 mg/ml

Allantoiin: 1,00 mg/ml

3. RAVIMVORM

Nisakastutuslahus/nisaspri.

Sinine vedel lahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

5. LOOMALIIGID

Veis (piimalehmad).

6. NÄIDUSTUS(ED)

Nisade desinfektsiooniks lakteerivatel piimalehmadel ühe osana mastiidi ennetamise strateegiast.

Nisa naha ja nisa tipu hea seisukorra säilitamiseks.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Nisanahale manustamiseks.

Preparaat on kasutusvalmis nisakastutuslahus või pihus lüpsijärgseks kasutamiseks kuni kaks korda päevas.

Kasutada vähemalt 5 ml lehma kohta igal kasutuskorral.

Kasutada nisasid vahetult pärast iga lehma lüpsmist. Veenduda, et nisa oleks vähemalt kolme neljandiku pikkuse ulatuses lahusesse kastetud. Teise võimalusena pihustada preparaadiga iga nisa kogu pind vahetult pärast lüpsmist.

Kui vaja, tuleb kastutustopsi või pihustipudelit täita.

Kui kastutamiseks kasutatakse tavalist kastutustopsi, tuleb iga lüpsi ajal kasutada värsket lahust. Kastutustops või pihustipudel iga lüpsikorra järel või kui tops saastub lüpsi ajal, tühjendada, puhastada ja loputada. Mitte valada ülejäänud lahust kastutustopsist või pihustipudelist tagasi originaalkonteinerisse. Mitte kasutada preparaati lüpsiseadmete puhastamiseks ja/või desinfitseerimiseks.

8. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne järgmist lüpsi veenduge, et udar ja nisad oleksid puhtad ja kuivad.

Võib kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Kloorheksidiini saab inaktiveerida anioonsete ja mitteioonsete pindaktiivsete (nt seebid, ka looduslikud) ainete või mitteorgaaniliste anioonidega, seetõttu mitte segada kraaniveega, teiste kemikaalidega, desinfitseerimisvahenditega ja teiste nisa- ja udarahooldusvahenditega.

See veterinaarravim on nisanahale manustamiseks, märkimisväärset imendumist ei toimu.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kui ilmnevad haiguse tunnused, konsulteerige veterinaararstiga.

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi kasutamine nisavigastuste korral võib aeglustada haavade paranemist nisadel. Nisavigastuste korral on soovitatav ravimit mitte manustada kuni vigastused on paranenud. Orgaanilise materjali (mäda, veri jne) esinemine võib piirata kloorheksidiini desinfitseerivat toimet.

Kui temperatuur on allpool külmumispunkti, laske nisadel enne lehmade väljalaskmist kuivada.

Laske preparaadil kuivada enne lehmade laskmist niiskuse (vihm), külma või tuule kätte.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida silma sattumist. Ravimi silma sattumisel loputada puhta voolava veega ning pöörduda arsti poole.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel juua suures koguses vett ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Hoida eemal toidust ja loomasöödadest.

Pärast kasutamist pesta käed.

Kui preparaati manustatakse pihustipudeliga, vältida töötamist pihuseodus.

Inimesed, kes on kloorheksidiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Väga harvadel juhtudel võib nisakastatusvahendi toimeaine muutmine põhjustada naha ärritust.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida ei ole loetletud käesoleval etiketil, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust kloorheksidiini või ravimi ükskõik milliste abiainetega suhtes.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.

Hävitamise kuupäev: ____ / ____ / ____

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida konteiner tihedalt suletuna.

Mitte lasta külmuda.

Kui veterinaarravim on külmunud, sulatada see soojas kohas üles ja loksutada hästi enne kasutamist.

Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil.

200-liitrilist mitmeannuselist konteinerit ei pea tagastama uuesti täitmiseks.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. OHTLIK KALADELE JA TEISTELE VEEORGANISMIDELE. Ravim ega kasutatud konteinerid ei tohi sattuda tiikidesse, kraavidesse ega teistesse veekogudesse.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress:

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Belgia

Tel. +32 (0) 57 21 78 77

Fax. +32 (0) 57 21 78 79

Mail: info@cidlines.com

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1720

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: