

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Broncophen Aerol, suuõõnesprei, lahus aed-liivatee ürdi vedelekstrakt, salvei lehtede vedelekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Broncophen Aerol ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Broncophen Aerol'i kasutamist
3. Kuidas Broncophen Aerol'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Broncophen Aerol'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Broncophen Aerol ja milleks seda kasutatakse

Broncophen Aerol suuõõnesprei on lahus, mis sisaldab toimeainetena aed-liivatee ürdi ja salvei lehtede vedelekstrakte.

See on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mida kasutatakse leevendava vahendina ülemiste hingamisteede infektsioonidega kaasneva suuõõne- või neelupõletiku korral.

See ravim on traditsiooniline taimne ravimpreparaat, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Broncophen Aerol'i kasutamist

Broncophen Aerol'i ei tohi kasutada

- kui olete aed-liivatee, salvei või teiste huulõieliste sugukonda kuuluvate taimede või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Broncophen Aerol'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Mitte pihustada silma ega ninna.
- Mitte pihustada lahtise tule läheduses.
- Kui tekib hingeldus, palavik või mädane rögaeritus, peate pöörduma arsti poole.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, sest puuduvad piisavad andmed kasutamise kohta selles vanuserühmas.

Muud ravimid ja Broncophen Aerol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Broncophen Aerol'i koostoimeid teiste ravimitega ei ole uuritud.

Salvei lehti sisaldavate preparaatide võtmine võib mõjutada GABA retseptori vahendusel toimivate ravimite (nt barbituraadid ja bensodiasepiinid) toimet, ehkki siiani ei ole selle kliinilisest avaldumisest teateid. Seetõttu ei ole Broncophen Aerol'i soovitatav kasutada samaaegselt koos nende ravimpreparaatidega.

Broncophen Aerol koos toidu ja joogiga

Puuduvad uuringuandmed toidu ja joogi mõju kohta ravimi toimele.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Broncophen Aerol'i ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal, sest selle kohta puuduvad piisavad andmed.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Broncophen Aerol ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

Broncophen Aerol sisaldab alkoholi

Ravim sisaldab 75,7 mg alkoholi (etanol) ühes pihustuses. Alkoholi sisaldus selle ravimi ühes pihustuses on väiksem kui 2 ml-s õlles või 1 ml-s veinis.

Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet.

Broncophen Aerol sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes pihustuses, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.


3. Kuidas Broncophen Aerol'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teile määranud teisiti, kasutage spreid 2...4 korda ööpäevas, pihustades lahust suhu ja neelu, vajutades igal manustamisel pihustit üks või kaks korda.

Manustamine:

- Tõstke pihustipumba pööratav otsik pudeli suhtes täisnurga alla (vt joonist).
- Suunake pihustipea soovitud manustamiskohta suus. Pihustipumba otsik on kergesti suunatav.
- Pihustage Broncophen Aerol'i, vajutades korduvalt pihustile.
- Pärast iga manustamist keerake otsik tagasi, nii sulgete pihustipumba (vt joonist).



Kasutamine lastel ja noorukitel

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel ja noorukitel, sest selle kohta puuduvad piisavad andmed.

Kui te kasutate Broncophen Aerol'i rohkem, kui ette nähtud

On teatatud üleannustamise juhtudest, mille korral manustati annuseid, mis vastasid rohkem kui 15 g salveilehtedele. Sellisel juhul võivad teil tekkida

- kuumatunne
- südame löögisageduse kiirenemine
- pearinglus
- krambid

Olulise üleannustamise korral võtke ühendust arstiga. Ta soovib teile asjakohaseid ravivõtteid.

Kui te unustate Broncophen Aerol'i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Broncophen Aerol'i kasutamise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aed-liivateed sisaldavate ravimpreparaatide kasutamisel on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone (sh üks anafülaktilise šoki juht ja üks Quincke ödeemi juht) ning maoärritust.

Alkoholisalduse tõttu võib põletikulistes piirkondades esineda mööduvat põletustunnet.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Broncophen Aerol'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 8 nädalat.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja pakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Broncophen Aerol sisaldab

- Toimeained on aed-liivatee ürdi vedelekstrakt ja salvei lehtede vedelekstrakt.
- Teised abiained on piparmündi lehtede (*Menthae piperitae folium*) vedelekstrakt (droogi/ekstrakti suhe 1:4–6, ekstrahent etanool (70% V/V)), L-mentool, naatriumsahhariin (E954), hüdroksüpropüütselluloos, etanool, puhastatud vesi.

1 ml lahust sisaldab:

290 mg aed-liivatee ürdi vedelekstrakti (1:4 - 6), ekstrahent: etanool 70% V/V.

290 mg salvei lehtede vedelekstrakti (1:4 - 6), ekstrahent: etanool 70% V/V.

1 pihustus = 0,14 ml.

Kuidas Broncophen Aerol välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen Aerol suuõõnesprei on selge pruuni värvi lahus, millel on iseloomulik lõhn ja maitse. Suuõõnesprei on saadaval merevaikkollastes klaaspudelites, mis on varustatud pihustipumba ja pikendatud pihustiotsikuga.

Pakendis on pudel 15 ml lahusega (piisab vähemalt 100 manustamiskorraks).

Müügiloa hoidja ja tootja

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21

1160 Vienna

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2020.