

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cardace Forte, 10 mg/12,5 mg tabletid

Cardace Forte, 10 mg/25 mg tabletid

Ramipriil/hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Cardace Forte ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cardace Forte võtmist
3. Kuidas Cardace Forte't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cardace Forte't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Cardace Forte ja milleks seda kasutatakse

Cardace Forte on kombinatsioon kahest ravimist, milleks on ramipriil ja hüdroklorotiasiid.

Ramipriil kuulub ravimrühma, mida nimetatakse AKE (angiotensiini konverteeriv ensüüm) inhibiitoriteks. See toimib järgnevalt:

- vähendab teie organismis ainete tootmist, mis tõstavad teie vererõhku,
- lõõgastab ja laiendab teie veresooni,
- hõlbustab teie südame tööd vere pumpamisel organismis.

Hüdroklorotiasiid kuulub ravimrühma, mida nimetatakse tiasiid-diureetikumiteks või vett väljutavateks tablettideks. See suurendab vee (uriini) teket. See alandab teie vererõhku.

Cardace Forte't kasutatakse kõrge vererõhu raviks. Kaks toimeainet toimivad koos, langetades teie vererõhku. Neid kasutatakse koos juhul, kui üksiku ravimi kasutamine osutus ebapiisavaks.

2. Mida on vaja teada enne Cardace Forte võtmist

Ärge võtke Cardace Forte't:

- Kui olete ramipriili, hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- Kui te olete allergiline Cardace Forte'le sarnaste ravimite suhtes (teised AKE inhibiitorid või sulfoonamiidi derivaadid).
Allergianähtude hulka võivad kuuluda nahalööve, neelamis- või hingamisprobleemid, huulte, nää, kõri või keele turse.
- Kui teil on kunagi olnud tõsine allergiline reaktsioon, mille nimetus on „angioödem“. Selle ilminguteks on sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased laigud kätel, jalgadel ja kõris, kõri ja keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis- ja neelamisraskus.
- Kui te olete võtnud või võtate praegu sakubitriil/valsartaani, ravimit, mida kasutatakse teatud tüüpi pikaajalise (kroonilise) südamepuudulikkuse raviks täiskasvanutel.

- Kui te saate dialüüsi või muud tüüpi vere filtratsioonravi. Sõltuvalt kasutatavast seadmest ei pruugi Cardace Forte teile sobida.
- Kui teil on maksaprobleemid.
- Kui teie vere soolasisaldus (kaltsium, kaalium, naatrium) ei ole normis.
- Kui teie neerud ei tööta korralikult, k.a olukord, kui teie neerude verevarustus on häiritud neeruarteri ahenemise (stenoos) tõttu.
- **Viimasel 6 raseduskuul** (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine“).
- Kui te toidate last rinnaga (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine“).
- Kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui midagi ülalloeletlust kehtib teie kohta, siis ärge võtke Cardace Forte't. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Cardace Forte võtmist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cardace Forte võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- Kui teil on südameprobleemid.
 - Kui te olete kaotanud rohkesti soolaseid või kehavedelikku (oksendades, kõhulahtisusega, higistades tavalisest rohkem, olles madala soolasisaldusega dieedil, võttes diureetikume (vett väljutavad ravimid) pikka aega või dialüüsraviga).
 - Kui teil on kavas ravida mesilase või herilase nõelamisest tingitud allergiat (desensitisatsioon).
 - Kui teile on plaanis manustada anesteetikumi. Seda võidakse manustada operatsiooni tegemise või hambaravi jaoks. Võib osutada vajalikuks katkestada ravi Cardace Forte'ga üks päev enne seda; küsige arstilt nõu.
 - Kui teie veres on rohkesti kaaliumi (nähtub vereproovist).
 - Kui te võtate ravimeid või teil on seisund, mis võib langetada naatriumi taset teie veres. Teie arst võib suunata teid regulaarselt vereanalüüsile, et kontrollida peamiselt naatriumi taset teie veres, eriti kui olete eakas.
 - Kui te võtate ravimeid, mis võivad suurendada angioödeemi, tõsise allergilise reaktsiooni, tekkeriski, nagu mTOR inhibiitorid (nt temsiroliimus, everoliimus, siroliimus), vildagliptiin, nerpilüsiini (NEP) inhibiitorid (nt ratsekadotriil) või sakubitriil/valsartaan. Sakubitriil/valsartaani kohta vt lõik „Ärge võtke Cardace Forte't“.
 - Kui teil on veresoonte kollageenhaigus nagu skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus.
 - Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate et olete rase (või arvate et võite jääda rasedaks). Cardace Forte't ei soovitata võtta esimesel 3 raseduskuul ning pärast esimest 3 raseduskuud võib see tõsiselt kahjustada teie beebit (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine“).
 - Kui teie nägemisteravus halveneb või teie silmad valutavad, eriti kui teil on oht glaukoomi tekkeks või teil on allergia penitsilliini või sulfoonamiidi sisaldavate ravimite suhtes.
 - Kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 - angiotensiin II retseptori antagonist, lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 - aliskireen.
- Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.
Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Cardace Forte't“.
- Kui teil on olnud nahavähk või kui teil tekib ravi ajal ootamatu nahamuutus. Ravi hüdroklorotiasiidiga, eriti pikaajaline ravi suurte annustega, võib suurendada teatud naha- ja huulevähi liikide riski (mitte-melanoomne nahavähk). Kaitske ravi ajal Cardace Comp'i või Cardace Plus'iga nahka päikese ja UV-kiirgusega kokkupuute eest.

Kui midagi ülalloeletlust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne Cardace Forte võtmist.

Lapsed ja noorukid

Cardace Forte't ei soovitata lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, sest seda ravimit ei ole nendes vanuserühmades kunagi kasutatud.

Muud ravimid ja Cardace Forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Cardace Forte võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Mõned teised ravimid võivad samuti mõjutada Cardace Forte toimet.

Teatage oma arstile, kui te võtate mis tahes alljärgnevat ravimit. Need võivad Cardace Forte toimet nõrgendada:

- Ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d) nagu ibuprofeen, indometasiin ja aspiriin).
- Kõrgeenenud vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergia raviks kasutatavad ravimid nagu efedriin, noradrenaliin või adrenaliin. Teie arst peab kontrollima teie vererõhku.

Teatage oma arstile, kui te võtate mis tahes alljärgnevat ravimit. Need võivad suurendada kõrvaltoimete tekke võimalust, kui te võtate Cardace Forte't.

- Sakubitriil/valsartaan – kasutatakse teatud tüüpi pikaajalise (kroonilise) südamepuudulikkuse raviks täiskasvanutel (vt ka teavet pealkirja „Ärge võtke Cardace Forte't“ all).
- Ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d) nagu ibuprofeen, indometasiin ja aspiriin).
- Ravimid, mis võivad vähendada teie vere kaaliumisisaldust. Sinna hulka kuuluvad kõhukinnisuse vastased ravimid, diureetikumid (vett väljutavad tabletid), amfoteritsiin B (kasutatakse seeninfektsioonide vastu) ja AKTH (kasutatakse neerupealiste näärmete funktsiooni kontrolliks).
- Vähivastased ravimid (keemiaravi).
- Ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide ravis, sh südame rütmihäirete ravimid.
- Siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vastu võetavad ravimid nagu tsüklosporiin.
- Diureetikumid (vett väljutavad ravimid) nagu furosemiid.
- Ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, nt spironolaktoon, triamteren, amiloriid, kaaliumisoolad, trimetroprim üksi või kombinatsioonis sulfametoksasooliga (infektsioonide raviks) ja hepariin (vere vedeldaja).
- Steroidravimid põletiku vastu, nt prednisoloon.
- Kaltsiumilisandid.
- Allopurinool (kasutatakse vere kusihappesisalduse vähendamiseks).
- Prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim).
- Kolestüramiin (kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks).
- Karbamasepiin (epilepsia ravim).
- Hepariin (kasutatakse vere vedeldamiseks).
- Temsiroliimus (vähihaiguse ravim).
- Siroliimus, everoliimus (ravim äratõukereaktsiooni ennetamiseks).
- Vildagliptiin (kasutatakse 2. tüüpi diabeedi raviks).
- Ratsekadotriil (kasutatakse kõhulahtisuse korral).
- Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid: kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonist (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Cardace Forte't“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Teatage oma arstile, kui te võtate mis tahes alljärgnevat ravimit. Cardace Forte võib neid mõjutada.

- Suhkurtõve ravimid, nagu suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid ja insuliin. Cardace Forte võib langetada teie vere suhkrusisaldust. Cardace Forte't võttes peab hoolikalt kontrollima vere suhkrusisaldust.
- Liitium (vaimse tervise häirete raviks). Cardace Forte võib suurendada teie vere liitiumisisaldust. Arst peab teie vere liitiumisisaldust hoolikalt kontrollima.
- Ravimid, mis lõõgastavad teie lihaseid.
- Kiniin (malaariavastane ravim).
- Ravimid, mis sisaldavad joodi, mida võidakse haiglas kasutada pildidiagnostikas või röntgenuuringul.
- Penitsilliin (infektsiooniravim).

- Suu kaudu võetavad hüübimist pärssivad ravimid (suukaudsed antikoagulandid), nt varfariin.

Kui midagi ülaloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne Cardace Forte võtmist.

Uuringud

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- Kui uuritakse teie kõrvalkilpnäärme funktsiooni. Cardace Forte võib mõjutada selle uuringu tulemust.
- Kui olete tegevsportlane ja teil uuritakse dopinguinete kasutamist. Cardace Forte võib anda positiivse tulemuse.

Cardace Forte koos toidu, joogi ja alkoholiga

- Alkoholi tarvitamine koos Cardace Forte'ga võib põhjustada pearinglust või joobe tunnet. Kui te tunnete muret selle üle, kui palju te võite tarbida alkoholi ravi ajal Cardace Forte'ga, arutage seda oma arstiga, sest vererõhku langetavate ravimite ja alkoholi toimed võivad liituda.
- Cardace Forte't võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks).

Te ei peaks Cardace Forte't võtma esimesel 12 rasedusnädalal ning alates 13. rasedusnädalast ei tohi te seda üldse võtta, sest selle kasutamine raseduse ajal võib kahjustada beebit.

Kui te rasestute ravi ajal Cardace Forte'ga, öelge otsekohe oma arstile. Planeeritava raseduse korral on ennetavalt vaja üle minna sobivale alternatiivsele ravile.

Imetamine

Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Cardace Forte't võtta.

Enne mis tahes ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõned kõrvaltoimed (nt vererõhu langusega seotud sümptomid, nagu pearinglus) võivad kahjustada teie kontsentreerumis- ja reageerimisvõimet. See võib suurendada riski olukordades, kus need võimed on eriti olulised (nt autojuhtimine või masinatega töötamine). Cardace Forte võtmise ajal võib esineda pearinglust. Selle teke on tõenäolisem ravi alustamisel Cardace Forte'ga või pärast annuse suurendamist. Kui nii juhtub, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

3. Kuidas Cardace Forte't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju võtta

Kõrgeenenud vererõhu ravi

Teie arst kohandab teile vajalikku annust, kuni vererõhk on kontrolli all.

Eakad

Teie arst vähendab algannust ja kohandab teie annust aeglasemalt.

Selle ravimi võtmine

- Võtke seda ravimit suu kaudu iga päev samal ajal, tavaliselt hommikuti.
- Neelake tabletid tervelt alla koos vedelikuga.
- Ärge purustage ega närige tablette.

Kui te võtate Cardace Forte't rohkem kui ette nähtud

Õelge oma arstile või minge otsekohe lähima haigla esmaabi osakonda. Ärge ise juhtige autot teel haiglasse, vaid paluge kellelgi teisel teid viia või kutsuge kiirabi. Võtke ravimipakend endaga kaasa. Siis teab arst, mida te olete võtnud.

Kui te unustate Cardace Forte't võtta

- Kui teil jääb annus vahele, siis võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal.
- Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Cardace Forte võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate mis tahes alljärgnevat tõsist kõrvaltoimet – te võite vajada kiiresti ravi:

- Näo, huulte või kõri turse, mis raskendab neelamist või hingamist, samuti sügelus ja nahalööve. Need võivad olla märgid raskest allergilisest reaktsioonist Cardace Forte'le.
- Rasked nahareaktsioonid, kaasaarvatud lööve, haavandid teie suus, olemasoleva nahahaiguse halvenemine, punetus, villid või naha irdumine (nt Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs või multiformne erüteem).

Teatage otsekohe arstile, kui teil tekivad:

- Südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või jõulised südamelöögid (palpitatsioonid), valu rindekeres, pitsitustunne rindkeres või tõsisemad häired, kaasa arvatud südameatakk ja insult.
- Hingamisraskus, köha, palavik kestusega 2...3 päeva ja näljatunde vähenemine. Need võivad olla kopsukahjustuse, sh põletiku ilmingud.
- Verevalumid tavalisest kergemini, kestmav veritsus, mis tahes märk verejooksust (nt igemete veritsus), violetsed laigud nahal või infektsioonidesse haigestumine tavalisest lihtsamini, kurgu valulikkus ja palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk. Need võivad olla vere või luuüdi kahjustuse ilmingud.
- Tugev valu maos, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi (kõhunäärme põletik) ilming.
- Palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, maovalu, iiveldus, naha või silmade värvumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksaprobleemide, nt hepatiidi (maksapõletik) või maksakahjustuse ilmingud.
- Tugev valu silmades, hägune nägemine või halo nägemine valgusallika ümber, peavalu, rohke pisaravoolus või iiveldus ja oksendamine, mis võib olla seisund, mida nimetatakse glaukoomiks; nägemise halvenemine, lühinägevus, mis võivad esineda müopia nimelise seisundi korral.

Teised kõrvaltoimed.

Teatage oma arstile, kui mis tahes alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast kauem.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

- Peavalu, nõrkustunne või väsimustunne
- Pearingluse tunne. See on tõenäolisem, kui te alustate Cardace Forte võtmist või pärast annuse suurendamist
- Kuiv ärritusköha või bronhiit
- Kõrgeenenud veresuhkruisaldus teie vereproovis. Kui teil on diabeet, võib diabeet süveneda
- Kõrgeenenud kusi happesisaldus või tavalisest kõrgem rasvasisaldus teie vereproovis
- Valulikkud, punetavad ja tursunud liigesed.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

- Nahalööve koos tursega või ilma
- Nahaõhetus, minestamine, hüpotensioon (ebatavaliselt madal vererõhk), eriti kui tõusete järsku püsti või istuma
- Tasakaaluhäired (vertiigo)
- Sügelus ja ebatavalised nahaistingud nagu tuimus, kipitus, torkimine, põletus või judin nahal (paresteesia)
- Maitsetundlikkuse kadumine või muutus
- Unehäired
- Depressioonitunne, ärevus, tavalisest närvilisem tunne või rahutus
- Ninakinnisus, ninakõrvalurgete põletik (sinusiit), hingamisraskus
- Igeme põletik (gingiviit), turse suus
- Punetavad, sügelevad, tursunud või vesised silmad
- Helin kõrvades
- Hägune nägemine
- Juuste väljalangemine
- Valu rindkeres
- Lihasvalu
- Kõhukinnisus, valu maos või soolestikus
- Seede häired või iiveldus
- Päevase vedeliku erituse (uriini) koguse suurenemine
- Higistamine tavalisest rohkem või janutunne
- Söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia), näljatunde vähenemine
- Südame löögisageduse suurenemine või ebaregulaarseks muutumine
- Tursunud käed ja jalad. See võib viidata ülemäärasele vedelikupeetusele teie organismis
- Palavik
- Seksuaalne võimetus meestel
- Punaliblede, valgeliblede või vereliistakute arvu või hemoglobiiniisisalduse langus vereproovis
- Muutused vereproovis, mis näitavad muutusi maksa, pankrease või neerude töös
- Kaaliumi tavalisest väiksem sisaldus teie vereproovis.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st)

- Oksendamine, kõhulahtisuse teke või kõrvetised
- Punetav tursunud keel või suukuivus
- Kaaliumi tavalisest suurem sisaldus teie vereproovis.

Teised teatatud kõrvaltoimed:

Teatage oma arstile, kui midagi alljärgenevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast kauem.

- Kontsentreerumisraskus, rahutus või segasus
- Sõrmed ja varbad muudavad külmas värvi ja pärast ülessoojenemist torgivad või tunduvad valulikumad. See võib olla Raynaud' sündroom
- Rindade suurenemine meestel
- Verehüübed
- Kuulmise langus
- Tavalisest kuivemad silmad
- Asjad paistavad kollastena
- Veetustumine
- Turse, valulikkus ja punetus põses (süljenäärmete põletik)
- Turse soolestikus, mida kutsutakse „soole angioödeemiks“, mille korral ilmnevad sümptomid nagu kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus
- Tavalisest suurem tundlikkus päikesevalguse suhtes

- Naha raskekujuline ketendus või irdumine, sügelus, koldeline lööve või muud nahareaktsioonid nagu punetav lööve näol või otsaesisel
- Nahalööve või verevalumite teke
- Laigud nahal ja külmad jäsemed
- Käuunte probleemid (nt küunte lahtitulek või irdumine küünevallist)
- Skeletilihaste jäikus või võimetus liigutada lõuga (tetaania)
- Lihasnõrkus või lihaskrambid
- Seksuaalse iha vähenemine meestel või naistel
- Veri uriinis. See võib olla neeruhaiguse (interstitsiaalne nefriit) ilming
- Suhkrusisalduse suurenemine uriinis
- Teatavate valgeliblede arvu suurenemine teie vereproovis ((eosinofiilia)
- Vererakkude arvu vähenemine teie vereproovis (pantüütopeenia)
- Soolade nagu naatrium, kaltsium, magneesium ja kloriid sisalduse muutus teie vereproovis
- Uriini kontsentreerumine (tume värvus), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasusseisund ja krambid, mis võivad tuleneda ADH (antidiureetilise hormooni) liignõristusest. Kui teil on need sümptomid, võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga
- Aeglustunud või puudulikud reaktsioonid
- Lõhnataju muutus
- Hingamisraskus või astma süvenemine
- Naha- ja huulevähk (mitte-melanoomne nahavähk).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Cardace Forte't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cardace Forte sisaldab

- Toimeained on ramipriil ja hüdroklorotiasiid.

10 mg/12,5 mg: Üks tablett sisaldab 10 mg ramipriili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

10 mg/25 mg: Üks tablett sisaldab 10 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

10 mg/12,5 mg:

Teised koostisosad on hüpromelloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, naatriumstearüülfumaraat, punane raudoksiid ja kollane raudoksiid või E172.

10 mg/25 mg:

Teised koostisosad on hüpromelloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, punane raudoksiid (E172) ja naatriumstearüülfumaraat.

Kuidas Cardace Forte välja näeb ja pakendi sisu

Cardace Forte 10 mg/12,5 mg on oranž, mõlemalt küljelt lame, piklik tablett suurusega 8 mm x 4,4 mm, märgistusega „42/AV“ ühel küljel ja poolitusjoonega mõlemal küljel. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Cardace Forte 10 mg/12,5 mg tabletid on PVC/Al blisterpakendis, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 100 tabletti karbis.

Cardace Forte 10 mg/25 mg on roosa, mõlemalt küljelt lame, piklik tablett suurusega 10 mm x 5,6 mm, märgistusega „39/AV“ ühel küljel ja poolitusjoonega mõlemal küljel. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Cardace Forte 10 mg/25 mg tabletid on PVC/Al blisterpakendis, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 100 tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Eesti

Tootja

Sanofi S.p.A.

Strada Statale 17, Km 22

67019 Scoppito (AQ)

Itaalia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

BULGAARIA :

Tritace plus 10mg/12.5mg tablets

Tritace plus 10mg/25mg tablets

EESTI :

Cardace Forte 10 mg/12,5 mg tabletid

Cardace Forte 10 mg/25 mg tabletid

SAKSAMAA:

Delix plus HCT 10 mg/12,5 mg Tabletten

Delix plus HCT 10 mg/25 mg Tabletten

UNGARI:

Tritace HCT 10mg/12.5mg tablett

Tritace HCT 10mg/25mg tablett

ITAALIA:

Triatec HCT 10mg + 12.5mg compresse

Triatec HCT 10mg + 25mg compresse

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel 6273488

Infoleht on viimati uuendatud mais 2019.