

PAKENDI INFOLEHT

Vitamin AD₃E bela-pharm, süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Bela-pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Saksamaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vitamin AD₃E bela-pharm, süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeained:

retinoolpalmitaat 176,47 mg

(vastab 300 000 RÜ A-vitamiinile)

kolekaltsiferool 100,0 mg

(vastab 100 000 RÜ D₃-vitamiinile)

α-tokoferoolatsetaat (E-vitamiin) 50,00 mg

Abiained:

Keskmise ahelaga triglütseriidid.

Selge, kollane lahus.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Vitamiinide A, D₃ ja E puuduse ning sellest tingitud haigusseisundite ravi.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, koer.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Subkutaansekse või intramuskulaarseks manustamiseks.

Hobune:	2...4 ml
Vars:	0,4...1 ml
Veis:	5 ml
Vasikas:	2 ml
Siga:	1 ml
Põrsas (kuni 10 kg):	0,1...0,2 ml
Võõrdepõrsas:	0,2...0,4 ml
Koer (≤ 10 kg):	0,05 ml
Koer (11 – 20 kg):	0,08 – 0,12 ml
Koer (21 - 30 kg):	0,15 – 0,2 ml
Koer (31 - 50 kg):	0,3 ml

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod

10. KEELUAEG

0 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon:

Laboriloomadel on pärast vitamiin-A liigset manustamist täheldatud teratogeenset toimet.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

A-vitamiini märkimisväärne üleannustamine võib põhjustada hüpervitamiinose, mille sümptomiteks on uimasus, liikumishäired ja oksendamine.

Üleannustamisel tiinetel loomadel, eriti tiinuse varases järgus, on täheldatud loote imendumise, surnultsündide ja väärarendite sagenemist.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

**13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2017

15. LISAINFO

Pakendi suurused:

100 ml klaasviaalid 1, 6 või 12 kaupa pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.