

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Sedastop Vet, 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja:

Le Vet. Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Produlab Pharma B.V.  
Forellenweg 16  
4941 SJ Raamsdonkveer  
Holland

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Sedastop Vet, 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele  
atipamesoolvesinikkloriid

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

1 ml süstelahust sisaldab:

**Toimeaine:**

Atipamesoolvesinikkloriid 5 mg (vastab 4,27 mg atipamesoolile)

**Abiained:**

Metüülparahüdrosübensoaat (E218) 1 mg

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Medetomidiini või deksmedetomidiini rahustava ja muude toimete lõpetamine koertel ja kassidel.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Ei ole.

**6. KÕRVALTOIMED**

Kõrvaltoimeid esineb väga harva. Väga harva on täheldatud oksendamist või suurenenud süljeeritust, hingeldamist ja roojamist. Vähestel loomadel on täheldatud kiiresti mööduvat üliärksust ja tahhükardiat.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)

- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud)

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## 7. LOOMALIIGID

Koer, kass.

## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustatakse intramuskulaarselt (lihasesiseselt, i.m.) või subkutaanselt (nahaalusi, s.c.).

**Koera** Sedastop Vet`i annus milliliitrites on sama kui Sedastart Vet`i annus (mikrogrammides väljendatuna on Sedastop Vet`i annus võrreldes Sedastart Vet`i annusega viiekordne või deksmedetomidiini annusega võrreldes kümnekordne).

**Kassi** Sedastop Vet`i annus milliliitrites on pool Sedastart Vet`i annusest (mikrogrammides väljendatuna on Sedastop Vet`i annus võrreldes Sedastart Vet`i annusega kahe- ja poolekordne või deksmedetomidiini annusega võrreldes viiekordne).

Koer:	Sedastart Vet annus	Deksmedetomidiini annus	Sedastop Vet annus
	40 µg 1 kg kehamassi kohta	20 µg 1 kg kehamassi kohta	200 µg 1 kg kehamassi kohta
	Vastab 0,4 ml 10 kg kehamassi kohta		Vastab 0,4 ml 10 kg kehamassi kohta

Kass:	Sedastart Vet annus	Deksmedetomidiini annus	Sedastop Vet annus
	80 µg 1 kg kehamassi kohta	40 µg 1 kg kehamassi kohta	200 µg 1 kg kehamassi kohta
	Vastab 0,4 ml 5 kg kehamassi kohta		Vastab 0,2 ml 5 kg kehamassi kohta

Preparaati võib kasutada äratamisel ka siis, kui loom on uinutatud Sedastart Vet`i ja ketamiini või deksmedetomidiini ja ketamiini kombinatsiooniga. Annus on sama kui äratamisel pärast Sedastart Vet`i või deksmedetomidiini kasutamist ainsa ravimina. Atipamesooli ei tohi manustada enne 30...40 minuti möödumist ketamiinisüstist.

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Toime saabub kiiremini pärast intramuskulaarset manustamist. Annust võib vajadusel korrata. Sedastop Vet`i manustatakse 15...60 min pärast medetomidiini või deksmedetomidiini manustamist. Loom saavutab normaaloleku 5...10 minuti jooksul. Pärast Sedastop Vet`i manustamist looma häirida nii vähe kui võimalik.

## 10. KEELUAEG

Ei rakendata.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis, mitte lasta külmuda.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

## 12. ERIHOIATUSED

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Juhul kui medetomidiini või deksmedetomidiini manustati koos ketamiiniga ei tohi atipamesooli manustada enne 30...40 minuti möödumist ketamiinisüstist. Kui medetomidiini või deksmedetomidiini toime kõrvaldatakse varem, võib allesjääv ketamiini toime põhjustada krampe. Sedastop Vet`i ei tohi kasutada muude rahustavate ainete (nt atsepromasiini, diasepaami või opiaatide) toime kõrvaldamiseks.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida ravimi kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui see siiski juhtub, tuleb nahka või limaskesta kohe veega loputada.

### Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutamine ei ole soovitatav tiinuse ja laktatsiooni ajal.

### Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mittespetsiifilised tsentraalsed stimulaatorid (nt 4-aminopüridiin) potentsierivad atipamesooli äratavat toimet.

### Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Üleannustamine põhjustab ülierutuvust ja tahhükardiat. Need nähud on tavaliselt kerged ja mööduvad iseenesest mõne tunni jooksul ning seetõttu pole vastav ravi tavaliselt vajalik.

### Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

## 13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

## 14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2019

## 15. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.