

KOMBINEERITUD PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp ja polüpropüleenmahuti

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Intracare BV
Voltaweg 4
5466 AZ Veghel
Holland

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Intra Hoof-fit Gel 40 mg/g + 40 mg/g, geel piimaveistele

3. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

Vask: 40 mg/g
Tsink: 40 mg/g

Abiained:

Tartrasiin (E102)
Glütserool
Karmelloosnaatrium
Naatriumtärklisglükolaat C
Isopropüülalkohol
Puhastatud vesi

4. RAVIMVORM

Geel. Roheline, viskoosne, veepõhine geel.

5. PAKENDI SUURUS

Sisepakend: kogus 430 g
Välispakend: kogus 6 x 430 g

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kasutamiseks digitaalse dermatiidi raviprogrammi osana.

7. VASTUNÄIDUSTUSED

8. KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti

9. LOOMALIIGID

Veis (piimaveised).

10. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Kui kahjustatud piirkond on määrdunud, puhastada see ühekordselt kasutatava lapiga, et geeli oleks võimalik kanda otse kahjustusele. Geel kanda kahjustatud alale puhta pintsliga. Kogu kahjustatud piirkond katta geeliga järgmise ravirežiimi kohaselt:

Päev 0: Kanda geel kahjustatud alale ja katta sidemega.

Päev 3: Eemaldada side ja kanda kahjustatud alale uus kogus geeli, kuid jätta sidemega katmata.

Päev 7: Ebapiisava ravitulemuse korral manustada uus kogus geeli ja jätta sidemega katmata.

Kui ravi pole kümne päeva jooksul tulemusi andnud, võtta ühendust loomaarstiga.

Igasse geelipakendisse on lisatud ka pintsel, kuid pakend ei sisalda sidet.

11. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

12. KEELUAEG

0 päeva.

13. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikusaega, mis on märgitud sildil pärast EXP. Kõlblikusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

14. ERIHOIATUS(ED)

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravim võib põhjustada silmärritust.

Vältida ravimi silma sattumist.

Ravimi sattumisel silma loputada silmi kohe rohke veega.

Ravim võib olla allaneelamise korral ohtlik.

Vältida ravimiga kokkupuutunud käte kontakti suuga.

Ravimi manustamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Pärast ravimi manustamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole tõestatud. Toimeainete süsteemne imendumine on madal, mistõttu teratogeense, fetotoksilise või maternotoksilise toime ilmumine soovitatud annuste kasutamisel on ebatõenäoline.

Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

15. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

16. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

November 2017

17. LISAINFO

18. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

19. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

20. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 1 kuu.

Pärast esmast avamist kasutada kuni ...

21. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EE 1766

22. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: