

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lecrolyn sine 40 mg/ml silmatilgad, lahus naatriumkromoglükaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Lecrolyn sine ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Lecrolyn sine kasutamist
3. Kuidas Lecrolyn sine't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Lecrolyn sine't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Lecrolyn sine ja milleks seda kasutatakse

Lecrolyn sine sisaldab toimeainet nimetusega naatriumkromoglükaat. See kuulub allergiavastaste ravimite rühma.

Lecrolyn sine't kasutatakse allergiast põhjustatud silmasümptomite raviks. Ravim takistab teie silmas leiduvate histamiini sarnaste ainete vabanemist, mis muidu vallandaksid allergilise reaktsiooni.

Allergiliste reaktsioonide tunnuste hulka kuuluvad sügelevad, vesised, punetavad või põletikulised silmad ning silmalaukude paistetused. Tavaliselt esineb see mõlemas silmas.

Need nähud tekivad tavaliselt kevadel või suvel, kui rohu või puude õietolm satub silma inimestele, kes on selle suhtes tundlikud.

Kui sümptomid ei parane või pärast kahe päeva möödumist halvenevad, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Lecrolyn sine kasutamist

Lecrolyn sine't ei tohi kasutada

kui olete naatriumkromoglükaadi või Lecrolyn sine mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lecrolyn sine kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui need haigusnähud on tekkinud ainult ühes silmas, sest allergiline reaktsioon tekib tavaliselt mõlemasse silma korraga.

Muud ravimid ja Lecrolyn sine

Kui kasutate samal ajal ka teisi silmatilkasid, tuleb neid manustada vähemalt 15-minutilise vahega.

Rasedus ja imetamine

Kõrvalmõjusid lootele ei ole teada. Raseduse ja imetamise ajal võib Lecrolyn sine't kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sarnaselt teistele silmatilkadele võib Lecrolyn sine põhjustada lühiajalist nägemise hägustumist. Sel juhul ärge juhtige autot ega kasutage masinaid enne, kui nägemine on täielikult taastunud.

Kontaktläätsed

Lecrolyn sine ei sisalda säilitusaineid. Seetõttu võib seda kasutada koos kontaktläätsedega.

3. Kuidas Lecrolyn sine't kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Soovitav annus lastele ja täiskasvanutele on **1...2 tilka mõlemasse silma kaks korda päevas**. Kui sümptomite intensiivsuse tõttu on vajalik sagedam manustamine, ei tohi annuse manustamise sagedus ületada 4 korda ööpäevas.

Enne silmatilkade panekut:

- enne pudeli avamist peske käed
- pudeli esmakordsel avamisel tilgutage esimene tilk kasutamata välja;
- valige endale tilkade manustamiseks kõige mugavam asend (võite istuda, olla selili või seista peegli ees)

Ravimi tilgutamine silma:

1. Hoidke pudelist kinni vahetult korki alt ja keerake korki pudeli avamiseks. Lahuse saastumise vältimiseks ärge pudeliotsaga midagi puudutage.




2. Kallutage pea kuklasse ning hoidke pudelit silma kohal.



3. Tõmmake alumist silmalaugu allapoole ning vaadake üles. Pigistage kergelt pudelit ja laske lahuse tilgal langeda silma. Pange tähele, et pigistamisest kuni tilga väljumiseni võib kuluda mõni sekund. Ärge pigistage liiga tugevasti.



4. Pilgutage paar korda, et lahus jaotuks silmas laiali.
5. Lecrolyn sine tilgutamiseks ka teise silma järgige juhiseid 2 kuni 4.



6. Enne pudelile korki tagasi panemist raputage seda üks kord alaspidi, et eemaldada lahuse jäägid pudeli otsikult. See on vajalik, et tagada pudeli kasutatavus.

Kui teie sümptomid ei parane või pärast Lecrolyn sine kasutamist kahe päeva jooksul halvenevad, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitav on kasutada silmatilku regulaarselt iga päev, kui on õietolmu kõrgaeg, nii hoiate sümptomite tekke ära.

Kui te kasutate Lecrolyn sine't rohkem, kui ette nähtud

Lecrolyn sine üleannustamisega kaasnevaid reaktsioone ei ole teada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatud on allergilistest (ülitundlikkuse) reaktsioonidest. Nende sagedus ei ole siiski teada.

Kui teil tekivad sümptomid, nagu lööve, neelamis- või hingamishäired, huulte, näo, kõri, keele paistetus ja punetuse suurenemine, peate kohe arsti poole pöörduma.

Sage kõrvaltoime (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st) on silmade paikne kipitus.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Lecrolyn sine't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „EXP/Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pudeli esmakordselt avamisest alates tuleb ravim ära kasutada **8 nädala** jooksul. Pudel tuleb hoida kindlalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lecrolyn sine sisaldab

- Toimeaine on naatriumkromoglükaat. 1 ml lahust sisaldab 40 mg naatriumkromoglükaati.
- Teised koostisosad on glütserool, dinaatriumedetaat, polüvinüülalkohol, süstevesi.

Kuidas Lecrolyn sine välja näeb ja pakendi sisu

Lecrolyn sine on läbipaistev, värvitu või helekollakas lahus.

Sisaldub valges plastpudelis, millel on sinise tilgutiotsaga valge tilguti ning valge keeratav plastkork.

Pakendi suurused: 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml ja 1 x 10 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Soome

Tootja

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere
Soome

Infoleht on viimati uuendatud mais 2021.