

PAKENDI INFOLEHT
Oxytobel, 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja kassidele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja

Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Lohner Strasse 19
49377 Vechta
Saksamaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxytobel, 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja kassidele
oksütotsiin

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

Toimeaine:

Oksütotsiin 16,6 µg (mis vastab 10 RÜ-le oksütotsiinile)

Abiained:

Kloorbutanoolhemihüdraat 3,0 mg

Selge värvitu lahus.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Märadel, lehmadel, emistel, uttedel, emastel kitsedel, emastel koertel ja emastel kassidel on ravim näidustatud:

- Sünnitusabis kasutamiseks (emaka kontraktsioonide stimuleerimiseks, et hõlbustada poegimist täielikult avanenud emakakaela korral, sünnitusjärgselt emaka involutsiooni soodustamiseks, abistamiseks sünnitusjärgsete hemorraagiatega peatamisel).
- Agalaktia korral piimaeritumise soodustamiseks.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada obstruktiivse düstokia korral ja/või kui emakakael ei ole avanenud.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Ei ole.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Hobune (märad), veis (lehmad), siga (emised), lammas (uted), kits (emased kitsed), koer (emased koerad) ja kass (emased kassid).

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustada subkutaanse (nahaaluse) või intramuskulaarse (lihasesisese) süstena.

Märad ja lehmad	4...6 ml
Emised	1...3 ml
Uted ja emased kitsed	1...2 ml
Emased koerad ja emased kassid	0,25...1 ml

Agalaktia (piimatuse) raviks tuleb kasutada märgitud suuremat annust.

Aeglase intravenoosse manustamise korral on annus 1/3 ülaltoodud annusest.

Annuse suurendamine ei põhjusta farmakoloogilise toime proportsionaalset tugevnemist.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ei rakendata.

10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Avatult hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Füsioloogilisel tasemel vähendab adrenaliini märgatavalt oksütotsiini toimet emakale või piimanäärmetele. Seetõttu ei tohi looma ehmatada, kui soovitakse oksütotsiini täielikku toime avaldumist kas piimaeritumise soodustamisel või emaka kontraktsioonide stimuleerimisel.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kui ravimit kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist olla veendunud, et emakakael on laienenud hoidmaks ära loote surma ja emaka võimaliku rebenemise.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Rasedad või imetavad naised peaksid preparaadi käsitlemist vältima, sest ravim võib põhjustada silelihaste (nt emaka) kontraktsioone.

Ravimit manustades tuleb vältida juhuslikku iseendale süstimist.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon

Ravim on vastavalt vajadusele ette nähtud kasutamiseks poegimise ja laktatsiooni ajal.

Mitte kasutada tiinuse ajal, välja arvatud poegimise ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seda veterinaarravimit võib manustada samaaegselt endometriidi raviks kasutatavate antibiootikumidega.

Beetaadrenergiliste retseptorite stimuleerimine võib nõrgendada oksütotsiini toimet emakale ja piimanäärmele.

Sümpatomimeetiliste ainete või teiste vasokonstriktorite samaaegne kasutamine oksütotsiiniga võib põhjustada poegimisjärgset hüpertensiooni.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Veterinaarravimi ülemäärane annus võib poegimist edasi lükata, põhjustades emaka koordineerimatuid kontraktsioone, mis takistab loote edasi liikumist eeskätt mitmike korral.

Kui ravimit kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist olla veendunud, et emakakael on laienenud hoidmaks ära loote surma ja emaka võimaliku rebenemise. Üleannuse ravi on palliatiivne ja spetsiifilised antidoodid puuduvad.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2019

15. LISAINFO

Pakendi suurused

Pappkarbis 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 12 x 10 ml, 1 x 25 ml, 10 x 25 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml või 12 x 100 ml.

Pakitud fooliumisse (hulgipakend) 6 x (1 x 50 ml) või 6 x (1 x 100 ml).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja poole.