

PAKENDI INFOLEHT
Glucosum Vetoquinol, 400 mg/ml infusioonilahus

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdynskich 13-14
66-400 Gorzów Wlkp.
Poola

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Glucosum Vetoquinol, 400 mg/ml infusioonilahus
Glükoos

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1ml infusioonilahust sisaldab:

Toimeaine:

Glükoosi (monohüdraadina)400mg

Abiained::

Süstevesi kuni 1,0 ml.

Selge, kollakas lahus.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Energiavaeguse, sealhulgas hüpoplükeemia ja kliinilise ketoosi raviks.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Hüperglükeemia, liigne hüdratsioon, hüpotooniline dehüdratsioon.

6. KÕRVALTOIMED

Hüpertooniline glükoosilahus võib ärritada perifeerseid veene, põhjustades paikset trombooset põletikku. Kui preparaati manustatakse ainsa vedelikuna, võib see viia vee ja elektrolüütide tasakaalu häirimiseni, sealhulgas hüpokaleemia, hüpopofateemia ja hüpomagneseemia tekkimiseni. Suurte annuste pikaajaline või kiire manustamine võib suurendada diureesi ja tekitada dehüdratsiooni.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Veis, hobune, lammas, kits, siga, koer ja kass.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ainult intravenoosseks manustamiseks.

Preparaati tuleb manustada aeglaselt 0,5 g glükoosi 1 kg kehamassi kohta tunnis.

Veised, hobused: 100...125 g glükoosi, mis vastab 250...312,5 ml preparaadile.

Lambad, kitsed, sead: 12,5...25 g glükoosi, mis vastab 31...62,5 ml preparaadile.

Pörsad, koerad, kassid: 1,25...7,5 g glükoosi, mis vastab 3...19 ml preparaadile.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Enne manustamist tuleb preparaat soojendada kehatemperatuurini!

Ravim ei sisalda antimikroobset säilitusainet. Kasutamata jäänud pakendi sisu tuleb ära visata.

10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: veis, hobune, lammas, kits, siga: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva.

Koer, kass: ei rakendata.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast „EXP“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

40% glükoosi lahus põhjustab kudedes ärritust, seega tuleks vältida ekstravenoosset manustamist.

Preparaati tuleb eelnevalt soojendada kehatemperatuurini ja seejärel manustada aeglaselt intravenoosselt.

Tugevalt hüpertooniliste lahuste kasutamine dehüdreerunud loomadel suurendab koe dehüdratsiooni, mis on tingitud rakusisese vedeliku liikumisest rakkudevahelisse ruumi.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni perioodil:

Ei ole kirjeldatud vastunäidustusi glükoosi kasutamiseks tiinuse ja imetamise ajal. Glükoos läbib platsentaarbarjääri ja jõuab loote plasmasse väiksemas kontsentratsioonis, kui see on emaloomal. Emalooma vereplasma glükoosi ja platsentast läbi läinud glükoosi kontsentratsioonide vahel on lineaarne sõltuvus.

Üleannustamine:

Üleannustamine võib põhjustada hüperglükeemiat ja osmootset diureesi. Kui glükoosi kontsentratsioon veistel ületab väärtuse 6,5 mmol/l ja lihtmaolistel loomadel 11 mmol/l, ületatakse „neerulävi“ ja selle tagajärjel tekib glükosuuria.

Sobimatus:

Preparaat ei sobi kokku aminofüllüüni, lahustuvate barbituraatide, erütromütsiini, hüdrokortisooni, varfariini, kanamütsiini, lahustuvate sulfoonamiidide ja vitamiin B₁₂-ga.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsi palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2015

15. LISAINFO

Pakendid:

250 ml klaaspudel.

500 ml polüpropüleenpudel.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Tel: 800 9000