

PAKENDI INFOLEHT

Animedazon, 2,45% w/w nahasprei, suspensioon veistele, lammastele ja sigadele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Saksamaa

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Animedazon, 2,45% w/w nahasprei, suspensioon veistele, lammastele ja sigadele
Kloortetratsükliinvesinikkloriid

3. TOIMEAINE(TE) JA ABI AINE(TE) SISALDUS

Üks spreikonteiner sisaldab:

Toimeaine:

Kloortetratsükliinvesinikkloriid 3,21 g (vastab 2,45% w/w)
(vastab 2,983 g kloortetratsükliinile)

Abiaine(d):

Patentsinine V 85% (E131): 0,23 g
Isobutaan (propellent) 92,2 g

Ühtlaselt sinist värvi spreii.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Pindmiste traumaatiliste või kirurgiliste kloortetratsükliinile tundlike mikroobidega saastunud haavade raviks. Ravimit võib kasutada pindmiste naha- ja sõrainfektsioonide, eriti kloortetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud interdigitaalse dermatiidi (sõramädanik ja varvastevahenaha põletik) ja digitaalse dermatiidi ravi osana.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide suhtes. Mitte kasutada, kui esineb teadaolevat resistentsust tetratsükliinide suhtes.

6. KÕRVALTOIMED

Ülitundlikkusreaktsioone esineb harva.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Veis, lammas ja siga.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Kasutamiseks nahal. Enne pihustamist tuleb mahutit hoolega raputada. Hoida mahutit ligikaudu 15...20 cm kaugusel pihustatavast piirkonnast; pihustada 3 sekundit, kuni ravitav ala on ühtlaselt värviga kaetud. Sõrainfektsiooni puhul korrata protseduuri 30 sekundi pärast. Pindmiste, kloortetratsükliinile tundlike mikroobidega saastunud haavade raviks on soovitatav ühekordne manustamine. Digitaalse dermatiidi puhul on soovitatav manustada ravimit kaks korda 30-sekundiliste vahedega kolmel järjestikusel päeval, üks või kaks korda päevas. Muude sõrainfektsioonide raviks (sõramädanik ja varvastevahenaha põletik) on soovitatav kaks manustamist 30-sekundiliste vahedega üks või kaks korda päevas. Sõltuvalt vigastuse tõsidusest ja paranemismäärast tuleb ravi korrata 1...3 päeva möödumisel.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõik 8 „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod”.

10. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lakteerivate loomade udaratel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud mahutil/etiketil pärast „Kõlblik kuni”.

Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C.

Hoida eemal soojusallikatest / kuumadest pindadest / sädemetest / lahtisest tulest ja teistest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Mitte pihustada lahtise tule ega muu süüteallika suunas.

Mitte purustada ega põletada mahutit isegi pärast kasutamist.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi pihustamisel peapiirkonda tuleb looma silmi kaitsta. Enne pihustamist puhastada kahjustatud piirkond põhjalikult. Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Takistada ravitud piirkondade lakkumist enda või teise looma nahal. Pärast sõra töötlemist hoida looma vähemalt ühe tunni jooksul kuival pinnal.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Kloortetratsükliini suhtes sensitiseerimise, kontaktdermatiidi ja ülitundlikkusreaktsioonide tekkimise riski tõttu tuleb vältida otsest kokkupuudet nahaga. Ravimi käsitlemisel tuleb kanda sobivaid mitteläbilaskvaid kaitsekindaid. See ravim võib põhjustada tõsist silmärritust. Kaitske silmi ja nägu. Kokkupuutel naha või silmadega peske piirkonda kohe puhta veega. Ärrituse püsimisel pöörduge arsti poole. Vältige aurude sissehingamist. Manustage ravimit vabas õhus või hästi ventileeritud kohas. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake talle pakendi etiketti. Ravimi manustamise ajal ei tohi süüa ega suitsetada. Pärast kasutamist peske käed. Vt ka lõik 11 „Säilitamise eritingimused”.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Pärast Animedazon kutaanset manustamist imendub kloortetratsükliin ebaolulisel määral. Seetõttu on Animedazon kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil ohutu.

Tiinus

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon

Vt lõik 10 „Keeluaeg”.

Muud ettevaatusabinõud

Ravimiga kokkupuutunud osa seanhast eemaldada enne lihakeha inimtoiduks tarvitamist.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pärast kloortetratsükliin-sprei kutaanset manustamist imendub kloortetratsükliin ebaolulisel määral. Andmed koostoimete kohta teiste ravimitega puuduvad. Koostoimeid ei ole oodata.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2020

15. LISAINFO

1 spreikonteiner.

Pappkarp, milles on 12 spreikonteinerit.

Survestatud mahuti, mis on valmistatud kattekihita plekist ning varustatud plastist klappimehhanismi ja pihustamisotsikuga, on 211 ml ulatuses ravimiga täidetud.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Retseptiravim.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

AS MAGNUM VETERINAARIA

Vae 16, Laagri

76401 Harjumaa

Eesti Vabariik