

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Ovulike, 0,004 mg/ml süstelahus veistele, hobustele, küülikutele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja:

T.P. Whelehan Son & Co. Ltd.  
Bracetown Business Park  
Clonee  
Co. Meath  
Iirimaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

aniMedica GmbH  
Im Südfeld 9  
48308 Senden-Bösensell  
Saksamaa

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Ovulike, 0,004 mg/ml süstelahus veistele, hobustele, küülikutele

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

Üks ml süstelahust sisaldab:

**Toimeaine:**

Busereliin (busereliinatsetaadina) 0,004 mg/ml

**Abiaine(d):**

Bensüülalkohol (E1519) 20,0 mg/ml

Selge, värvitu lahus.

**4. NÄIDUSTUSED**

Lehm

Ovulatsiooni indutseerimine domineeriva folliikuliga lehmadel.  
Inna sünkroniseerimine ja ovulatsiooni indutseerimine.  
Munasarja follikulaartsüstide ravi.

Mära

Ovulatsiooni indutseerimine indlevatel märadel.  
Tiinestumise parandamine.

Küülik

Ovulatsiooni indutseerimine poegimisjärgse seemendamise ajal.  
Viljastumise parandamine.

## 5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine suhtes.

## 6. KÕRVALTOIMED

Puuduvad.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## 7. LOOMALIIGID

Veis, hobune, küülik.

## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramuskulaarseks (veised, hobused, küülikud), intravenosseks (hobused) või subkutaanseks (hobused, küülikud) manustamiseks.

Loomaliigid / näidustus	mg busereliini	ml süstelahust Ovulike
<b>Lehm</b>		
Ovulatsiooni indutseerimine domineeriva folliikuliga lehmadel	0,01	2,5
Inna sünkroniseerimine ja ovulatsiooni indutseerimine, kui kasutada järgmiselt: busereliini manustamine (0-päev), millele järgneb PGF2 $\alpha$ -ravi 7 päeva möödumisel (7. päev) ja teine busereliinravi 9 päeva möödumisel (9. päev).	0,01	2,5
Munasarja follikulaartsüstide raviks	0,02	5,0
<b>Mära</b>		
Ovulatsiooni indutseerimine indlevatel märadel, manustades korduvalt 12 tunniste intervallidega	0,02...0,04	5...10
Tiinestumise parandamine, manustades 8. kuni 12. päeval pärast loomulikku paaritumist/seemendamist	0,02...0,04	5...10
<b>Küülik</b>		
Ovulatsiooni indutseerimine poegimisjärgseks seemendamiseks	0,0008	0,2
Viljastumise parandamiseks	0,0008	0,2

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Puuduvad.

## 10. KEELUAEG

Veis, hobune, küülik

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Veis, hobune

Piimale: 0 päeva.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.  
Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil.  
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

## 12. ERIHOIATUSED

Ravi selle GnRH analoogiga on ainult sümptomaatiline, viljakushäirete põhjused selle raviga ei kao.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida ravimi sattumist nahale ja silma.

Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada põhjalikult rohke veega.

Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta koheselt seebi ja veega, sest GnRH analoogid võivad imenduda läbi naha.

Juhusliku ravimi iseendale süstimise vältimiseks tuleb ravimit manustada ettevaatlikult ning tagada, et loomad on õigesti fikseeritud ja manustamiskoel on kaetud kuni süstimise hetkeni.

Fertiilses eas naised peavad preparaati käsitsema ettevaatusega selle potentsiaalse toime tõttu reproduktiivsusele.

Rasedad ei tohi seda ravimit manustada.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada kogu tiinuse ajal ja laktatsiooni perioodil.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

## 13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadusandlusele.

## 14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2022

## 15. LISAINFO

Pappkarbis pakend 5 süstevialiga (I tüüpi klaas), igas 10 ml.

Pakend 50 (10 x 5) süstevialiga (mitmikpakend).

Pakend 100 (20 x 5) süstevialiga (mitmikpakend).

Pakend 250 (50 x 5) süstevialiga (mitmikpakend).

Pakend 500 (100 x 5) süstevialiga (mitmikpakend).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Retseptiravim.

Lisaküsimuste tekkimisel selle veterinaaravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Magnum Veterinaaria  
Vae 16, Laagri  
76401 Harjumaa  
Eesti Vabariik  
Tel. +372 6 501 920