

## Pakendi infoleht: teave kasutajale

### Airbufo Forspiro, 160 mikrogrammi/4,5 mikrogrammi annuses, annustatud inhalatsioonipulber budesoniid/formoteroolfumaraatdihüdraat

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Airbufo Forspiro ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Airbufo Forspiro kasutamist
3. Kuidas Airbufo Forspiro't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Airbufo Forspiro't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on Airbufo Forspiro ja milleks seda kasutatakse

Airbufo Forspiro on inhaleeritav ravim, mida kasutatakse järgmist haiguste raviks:

- **astma täiskasvanutel ja noorukitel vanuses 12 kuni 17 aastat**
- **kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) sümptomid täiskasvanutel alates 18 aasta vanusest.**

See sisaldab kahte toimeainet: budesoniidi ja formoteroolfumaraatdihüdraati.

- Budesoniid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks. See vähendab ja ennetab turset ning põletikku teie kopsudes.
- Formoteroolfumaraatdihüdraat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse pikatoimelisteks beeta<sub>2</sub>-agonistideks ehk bronhilõõgastiteks. See lõõgastab hingamisteede lihaseid ja aitab teil vabamalt hingata.

#### Astma

Astma korral võib Airbufo Forspiro't määrata kasutamiseks kahel erineval viisil.

- a) Mõnedele patsientidele määratakse kaks astma inhalaatorit: Airbufo Forspiro ja eraldi „hooinhalaator“.
  - Nad kasutavad Airbufo Forspiro't iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite tekkimist.
  - Patsiendid kasutavad „hooinhalaatorit“, kui neil tekivad astma sümptomid, et muuta hingamine taas kergemaks.
- b) Mõnedele patsientidele määratakse Airbufo Forspiro ainsa astmainhalaatorina.
  - Nad kasutavad Airbufo Forspiro't iga päev. See aitab ennetada astma sümptomite tekkimist.
  - Patsiendid kasutavad Airbufo Forspiro't ka siis, kui nad vajavad lisainhalatsioone astmasümptomite leevendamiseks ja hingamise kergemaks muutmiseks. Nad ei vaja selleks eraldi „hooinhalaatorit“.

#### Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)

Airbufo Forspiro't võib kasutada ka KOK-i sümptomite raviks täiskasvanutel. KOK on pikaajaline haigus, mida iseloomustavad pidevad hingamisraskused, mis on põhjustatud kopsu ahenenud hingamisteedest ning millega sageli kaasneb köha ja lima väljakõhimine. Haigus on sageli põhjustatud sigarettide suitsetamisest.

## 2. Mida on vaja teada enne Airbufo Forspiro kasutamist

### Ärge kasutage Airbufo Forspiro't, kui

- olete budsoniidi, formoterooli või selle ravimi teise koostisosa, laktoosi (sisaldab väikesi koguseid piimavalke), suhtes allergiline.

### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Airbufo Forspiro kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui

- teil on suhkurtõbi;
- teil on kopsuinfektsioon;
- teil on kõrge vererõhk või on varem esinenud südamehäireid (sh ebahütlased südamelöögid või väga kiire pulss, arterite ahenemine või südamepuudulikkus);
- teil esineb kilpnäärme või neerupealiste häireid;
- teie vere kaaliumisisaldus on madal;
- teil on rasked maksaprobleemid.

Kui teil esineb nägemise hägustumist või teisi nägemishäireid, võtke ühendust oma arstiga.

### Muud ravimid ja Airbufo Forspiro

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eelkõige rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

- beetablokaatorid (nt atenolool või propranolool kõrge vererõhu raviks), sh silmatilgad (nt timolool glaukoomi raviks);
- kiire või ebahütlase südametegevuse ravimid (nt kinidiin, disopüramiid ja prokaiinamiid);
- allergiaravimid ehk antihistamiinid, nt terfenadiin;
- oksütotsiin, ravim, mis hõlbustab sünnitust;
- prokarbasiin, vähktõve raviks kasutatav ravim;
- ravimid, nagu digoksiin, mida sageli kasutatakse südamepuudulikkuse raviks;
- diureetikumid, tuntakse ka „veetablettidena“ (nt furosemiid). Neid kasutatakse kõrge vererõhu raviks;
- kortikosteroidid (nt prednisoloon). Neid kasutatakse põletiku raviks või siiratud elundi äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks;
- ksantiini sisaldavad ravimid (nt teofülliin või aminofülliin), mida sageli kasutatakse astma raviks;
- teised hingamisteed laiendavad ravimid ehk bronhodilataatorid (nt salbutamool);
- depressiooni raviks kasutatavad ravimid, mida nimetatakse tritsüklilisteks antidepressantideks (nt amitriptüliin) ja antidepressant nefasodoon;
- psüühikahäirete, iivelduse või oksendamise ravimid, mida nimetatakse fenotiasinravimiteks (nt kloorpromasiin ja prokloorperasiin);
- seennakkuste ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool) ja bakteriaalsete infektsioonide ravimid (nt klaritromütsiin ja telitromütsiin, furasolidoon);
- Parkinsoni tõve ravimid (nt levodopa);
- kilpnäärmehaiguste ravimid (nt levotüroksiin);
- HIV-infektsiooni raviks kasutatavad ritonaviiir, kobitsistaat. Airbufo Forspiro toimed võivad tugevneda ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta või kui te pole selles kindel, pidage enne Airbufo Forspiro kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Samuti rääkige oma arstile või apteekrile, kui teile on plaanitakse teha üldnarkoos seoses operatsiooniga või hambaraviga.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

- Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Airbufo Forspiro kasutamist nõu oma arstiga. Ärge kasutage Airbufo Forspiro't ilma arsti vastava soovituseta.
- Kui te rasestute ravi ajal Airbufo Forspiro'ga, ärge lõpetage ise Airbufo Forspiro kasutamist, vaid pöörduge kohe oma arsti poole.
- Kui te toidate last rinnaga, rääkige sellest oma arstile enne, kui hakkate Airbufo Forspiro't kasutama.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Airbufo Forspiro ei oma või omab ebaolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

### **Airbufo Forspiro sisaldab laktoosi**

Airbufo Forspiro sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Ravimis sisalduv laktoosi kogus ei tekita tavaliselt probleeme laktoosi talumatusega isikutel.

Abiaine laktoos sisaldab väikest kogust piimavalke, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

## **3. Kuidas Airbufo Forspiro't kasutada**

- Kasutage Airbufo Forspiro't alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Oluline on kasutada Airbufo Forspiro't iga päev, isegi siis kui teil ei ole parasjagu astma või KOK-i sümptomeid.
- Kui te kasutate Airbufo Forspiro't astma raviks, peab teie arst regulaarselt kontrollima teie astma sümptomite avaldumist.

Kui te kasutate astma või KOK-i tõttu hormoon tablette, võib teie arst nende arvu vähendada, kui te alustate ravi Airbufo Forspiro'ga. Kui te olete suukaudseid hormoon tablette juba pikka aega kasutanud, kontrollib teie arst aeg-ajalt teie vereanalüüsi. Kui suukaudsete hormoon tablettide võtmist vähendatakse, võite te ennast mõnevõrra halvemini tunda, kuigi hingamisega seotud sümptomid taanduvad. Teil võib tekkida ninakinnisus või nohu, nõrkus või liigese- või lihasevalu, samuti nahalööve (ekseem). Võtke viivitamatult oma arstiga ühendust, kui need sümptomid teid häirivad või kui tekib peavalu, väsimus, iiveldus või oksendamine. Kui ilmnevad allergia või liigestega seotud sümptomid, võite te vajada muud ravi. Rääkige oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas jätkata Airbufo Forspiro kasutamist.

Teie arst võib teie tavaravile lisada hormoon tablette stressiperioodidel (nt kui teil on hingamisteede infektsioon või enne operatsiooni).

### **Oluline teave astma või KOK-i sümptomite kohta**

Kui te tunnete, et Airbufo Forspiro kasutamise ajal tekib hingeldus või vilistav hingamine, peate jätkama Airbufo Forspiro kasutamist, kuid pöörduma nii kiiresti kui võimalik arsti poole, sest võite vajada täiendavat ravi.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui:

- hingeldus süveneb või ärkate sageli öösel astmahoo tõttu;
- teil tekib hommikuti rinnus pigistav tunne või see tunne kestab pikemalt kui tavaliselt.

Need nähud võivad viidata sellele, et astma või KOK ei ole piisavalt kontrolli all ning te võite vajada senisest erinevat või täiendavat ravi erakorraliselt.

### **Astma**

Astma korral võib Airbufo Forspiro't määrata kasutamiseks kahel erineval viisil. Airbufo Forspiro kasutamise kogus ja aeg sõltub sellest, kuidas see teile määratud on.

- a) Kui teile on määratud Airbufo Forspiro ja eraldi „hooinhalaator“, lugege lõiku a) „Airbufo Forspiro ja eraldi „hooinhalaatori“ kasutamine“.
- b) Kui teile on määratud Airbufo Forspiro ainsa inhalaatorina, lugege lõiku b) „Airbufo Forspiro kasutamine ainsa inhalaatorina“.

### **a) Airbufo Forspiro ja eraldi „hooinhalaatori“ kasutamine**

**Kasutage Airbufo Forspiro't iga päev.** See aitab ennetada astma sümptomite tekkimist.

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

- Tavaline annus on 1 või 2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.
- Teie arst võib suurendada annust 4 inhalatsioonini kaks korda ööpäevas.
- Kui teie sümptomid alluvad hästi ravile, võib arst vähendada ravimi kasutamist ühele korrale ööpäevas.

Noorukid (12...17-aastased):

- Tavaline annus on 1 või 2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.
- Kui teie sümptomid alluvad hästi ravile, võib arst vähendada ravimi kasutamist ühele korrale ööpäevas.

Airbufo Forspiro't ei ole soovitatav kasutada alla 12-aastastel lastel.

Arst (või astmaõde) aitab teil astmat kontrolli all hoida. Nad aitavad teil ravimi annust kohandada väikseima annuseni, mis hoiab astma kontrolli all. Siiski ärge reguleerige annust ilma, et oleksite arstiga (või astmaõdega) enne rääkinud.

### **Kasutage astma sümptomite pärssimiseks oma „hooinhalaatorit“.**

Hoidke oma „hooinhalaator“ alati käepärast, et seda oleks võimalik vajadusel kohe kasutada. Ärge kasutage Airbufo Forspiro't sel juhul astma sümptomite raviks – kasutage selleks oma „hooinhalaatorit“.

### **b) Airbufo Forspiro kasutamine ainsa inhalaatorina**

Kasutage Airbufo Forspiro't sellisel viisil ainult siis, kui arst on teile seda soovitanud ja kui olete 12-aastane või vanem.

**Kasutage Airbufo Forspiro't iga päev.** See aitab ennetada astma sümptomite tekkimist. Te võite manustada:

- 1 inhalatsiooni hommikul ja 1 inhalatsiooni õhtul  
või
- 2 inhalatsiooni hommikul  
või
- 2 inhalatsiooni õhtul

Teie arst võib suurendada annust 2 inhalatsioonini kaks korda ööpäevas.

### **Kasutage Airbufo Forspiro't ka „hooravimina“, et leevendada vajadusel astma sümptomeid.**

- Kui teil tekivad astma sümptomid, manustage 1 inhalatsioon ja oodake paar minutit.
- Kui te ei tunne end paremini, manustage teine inhalatsioon.

- Ärge manustage rohkem kui 6 inhalatsiooni korraga.

Hoidke oma Airbufo Forpiro inhalaator alati käepärast, et saaksite seda vajadusel kohe kasutada.

Tavaliselt ei ole ööpäevast koguannust - 8 inhaleeritud annust - vaja. Siiski võib arst lubada teil manustada piiratud aja jooksul kuni 12 inhalatsiooni ööpäevas.

Kui te vajate regulaarselt 8 või rohkem inhalatsiooni ööpäevas, pöörduge oma arsti või meditsiiniõde poole. Nad peavad võib-olla teie ravi muutma.

Ärge kasutage rohkem kui 12 inhalatsiooni 24 tunni jooksul.

Kui teil tekivad füüsilise tegevuse ajal astma sümptomid, kasutage Airbufo Forspiro't, nagu siin on kirjeldatud. Kuid ärge kasutage Airbufo Forspiro't vahetult enne füüsilist tegevust, et astma sümptomeid ennetada.

### **Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)**

- Ravimit kasutatakse ainult täiskasvanutel (18-aastased ja vanemad)
- Tavaline annus on 2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.


Teie arst võib teile KOK-i raviks määrata ka teisi bronhilõõgastava toimega ravimeid, näiteks antikolinergilise toimega ravimeid (nagu tiotroopium või ipratroopiumbromiid).

### **Kasutusjuhised**

Teie arst, meditsiiniõde või apteeker peab teile inhalaatori kasutamist demonstreerima ning kontrollima regulaarselt, kas te inhalaatorit õigesti kasutate.


Inhalaator sisaldab 60 annust pulbrilist ravimit rullitud fooliumribas. Inhalaatoril on annuseloendur, mis näitab allesjäänud annuste arvu 60st kuni 0ni. Viimase 10 annuseni jõudes näidatakse arve punasel taustal.

Inhalaator ei ole taastäidetav. Palun visake tühi inhalaator ära ja asendage see uuega.



### Enne inhalaatori kasutamist

- Avage läbipaistev külgekambri ava.
- Eemaldage fooliumriba külgekambrist, rebides riba ettevaatlikult täispikkuses ära ja kasutades selleks külgekambri "hambaid", nagu on näidatud alltoodud pildil. **Ärge tõmmake ega sikutage riba.**



- Sulgege külgekambri ava ja visake kasutatud riba ära.

**Oluline!**


Inhalaatori kasutamise ajal täitub külgekamber järk-järgult kasutatud ribadega. Fooliumribad, millel on **mustad vöödid, ei sisalda ravimit**. Lõpuks ilmub külgekambrisse riba nummerdatud osa.

Külgekambris **ei tohi mitte kunagi olla rohkem kui 2 fooliumriba osa**, kuna need võivad inhalaatori ummistada. Riba tuleb ettevaatlikult ära rebida, nagu ülevalpool näidatud, ning ohutult kõrvaldada.

### Inhalaatori kasutamine


Inhalaatorit tuleb hoida käes nii, nagu pildidel näidatud.

#### 1. Avage




- Huuliku paljastamiseks **avage kaitsekork allasuunas**.
- Kontrollige annuseloendurit, et näha, mitu annust on veel alles.


#### 2. Valmistage annus ette



- **Lükake valge hoova serv üles**. Külgekamber peab olema suletud. **Pidage meeles!** Valget hooba tohib liigutada alles siis, kui olete valmis ravimiannuse sisse hingama. Kui te valge hoovaga niisama mängite, raiskate annuseid.




- **Avamine:** lükake valge hoob täielikult lõpuni, kuni kostab klõpsatus. See liigutus viib uue annuse ettenähtud kohta ja ülaosas on näha number.



- **Sulgemine:** pärast tuleb valge hoob täielikult sulgeda, kuni see klõpsatusega oma algasendisse tagasi läheb. Inhalaator on nüüd valmis koheseks kasutuseks.

### 3. Inhaleerige

- Hingake võimalikult sügavalt välja, inhalaatori huulikust eemale. **Mitte kunagi ei tohi hingata otse inhalaatorisse**, kuna see võib annuse kogust mõjutada.
- Hoidke inhalaatorit horisontaalselt, nii et **kaitsekork on suunatud allapoole**.
- Hoidke huuled tugevasti huuliku ümber vastu inhalaatorit.
- **Hingake ühtlaselt ja sügavalt sisse läbi inhalaatori ning mitte läbi nina.**





- Eemaldage inhalaator suult ja **hoidke hinge kinni 5–10 sekundit** või nii kaua, kuni see ei põhjusta ebamugavustunnet.
- Seejärel hingake aeglaselt välja, **kuid mitte inhalaatorisse.**
- Sulgege kaitsekork, kattes huuliku.
- Loputage suud veega ja sülitage vesi välja. Suu loputamine pärast ravimi manustamist aitab ära hoida seennakkuse ja häälekäheduse teket.

#### **Puhastamine**

- Huuliku välimist osa tuleb vajadusel puhastada puhta kuiva salvrätikuga.
- Inhalaatorit ei tohi puhastamiseks ega mis tahes muul eesmärgil lahti võtta!
- Inhalaatori osi ei tohi puhastada veega ega niiskete salvrätikutega, kuna niiskus võib mõjutada ravimiannust!
- Huulikusse ega teistesse osadesse ei tohi mitte kunagi pista nõelu ega teravaid asju, kuna see võib inhalaatorit kahjustada!

#### **Kui te võtate Airbufo Forspiro't rohkem kui ette nähtud**

Te peate oma annust manustama vastavalt sellele, kuidas see on kirjas infolehes või kuidas arst on teile määranud. Te ei tohi ületada teile määratud annust ilma sellest eelnevalt arstiga rääkimata.

Kõige tavalisemad sümptomid, mis võivad tekkida, kui olete võtnud rohkem Airbufo Forspiro't kui peaksite, on värin, peavalu või kiirenenud südamelöögid.

#### **Kui te unustate Airbufo Forspiro't võtta**

- Kui te unustate annuse manustamata, manustage see niipea kui meelde tuleb. Kui järgmise annuse manustamise aeg on juba peaaegu kätte jõudnud, jätke ununenud annus vahele.
- **Ärge** manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

#### **Kui midagi alljärgnevast juhtub teiega, lõpetage Airbufo Forspiro kasutamine ja pöörduge kohe oma arsti poole.**

- Näo turse, eriti suu ümbruses (keele- ja/või kõriturse ja/või raskused neelamisel) või nõgestõvelaadne lööve koos hingamisraskustega (angioödeem) ning/või äkiline nõrkustunne. See võib tähendada, et teil on tekkinud allergiline reaktsioon. Seda esineb harva (vähem kui 1 kasutajal 1000st).
- Äkiline vilistav hingamine või õhupuudus kohe pärast ravimi inhaleerimist. **Kui vähemalt üks nendest sümptomitest tekib, tuleb kohe Airbufo Forspiro kasutamine lõpetada ning kasutada „hooinhalaatorit“. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kuna võite vajada ravi muutmist.** Seda esineb väga harva (vähem kui 1 kasutajal 10 000st).

#### **Teised võimalikud kõrvaltoimed**

**Sage** (võib esineda kuni 1 kasutajal 10st)

- Südame pekslemine (südamelöökide tunnetamine), värin või värisemine. Kui need nähud ilmnevad, on need tavaliselt kerged ja kaovad enamasti Airbufo Forspiro kasutamise jätkamisel.
- Kandidiaas (seeninfektsioon) suus. See tekib väiksema tõenäosusega, kui loputate suud veega pärast Airbufo Forspiro kasutamist.
- Kerge kurguvalu, köha ja häälekähedus
- Peavalu
- Kopsupõletik KOK-iga patsientidel

Teatage oma arstile, kui teil tekib Airbufo Forspiro kasutamise ajal ükskõik milline järgnevatest nähtudest, need võivad olla kopsuinfektsiooni sümptomid.

- Palavik või külmavärinad
- Suurenenud limasteke, lima värvuse muutus.
- Köha süvenemine või hingamisraskuste süvenemine

**Aeg-ajalt** (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st)

- Rahutuse, närvilisuse või erutuse tunne
- Unehäired
- Peeringlustunne
- Nägemise hägustumine
- Iiveldus
- Kiirenenud südametegevus
- Verevalumid nahal
- Lihaskrambid
- Agressiivsus
- Ärevus

**Harv** (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000st)

- Nahalööve, sügelus
- Bronhospasm (hingamisteede lihaste spasm, mis põhjustab vilistavat hingamist). Kui vilistav hingamine algab äkitselt pärast Airbufo Forspiro kasutamist, lõpetage Airbufo Forspiro kasutamine ja teavitage sellest kohe arsti.
- Madal kaaliumisisaldus veres
- Ebaregulaarne südamerütm

**Väga harv** (võib esineda kuni 1 kasutajal 10 000st)

- Depressioon
- Muutused käitumises, eriti lastel
- Valu või pigistav tunne rinnus (rinnaangiin)
- Veresuhkru (glükoos) sisalduse suurenemine
- Maitsetundlikkuse muutused, nt ebameeldiv maitse suus
- Vererõhu muutused
- Kehakaalu tõus, kuukujuline nägu, nõrkus, kõhuõõne rasvumine (Cushingi sündroom)

Inhaleeritavad kortikosteroidid võivad mõjutada tavalist kehaomast steroidhormoonide teket, eriti kui kasutate ravimit suurtes annustes pikaajaliselt. Mõju hõlmab järgmist:

- muutused luu mineraalses tiheduses (luude hõrenemine);
- katarakti ehk hallkae (silma läätse hägusus) teke;
- glaukoomi (suurenenud silmasisene rõhk) teke;
- kasvu pidurdumine lastel ja noorukitel;
- mõju neerupealistele (väike nääre neeru vahetus läheduses);
- Cushingi sündroomi laadsed nähud;
- lisaks võib esineda suurenenud vastuvõtlikkus infektsioonidele ja võimetus kohaneda stressiga.

Need nähud avalduvad inhaleeritavate kortikosteroidide korral palju väiksema tõenäosusega kui kortikosteroidide kasutamisel tablettidena.

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## 5. Kuidas Airbufo Forspiro't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või inhalaatori etiketil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu teave

### Mida Airbufo Forspiro sisaldab

- Toimeained on budesoniid ja formoteroolfumaraatdihüdraat. Iga inhaleeritav annus sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati, mis vastab 194,7 mikrogrammile budesoniidi ja 6,1 mikrogrammile formoteroolfumaraatdihüdraadi mõõdetud annusele (blistris sisalduv annus).
- Teine koostisosa on laktoosmonohüdraat (sisaldab piimavalke).

### Kuidas Airbufo Forspiro välja näeb ja pakendi sisu

Airbufo Forspiro on punane/valge plastinhalaator, mis sisaldab teie ravimit. Iga inhalaator sisaldab OPA/Al/ PVC-Al blistrit, milles on 60 valmisannust inhalatsioonipulbrit. Inhalatsioonipulber on valge kuni valkjäs või kergelt kollane pulber ilma aglomeraatideta.

Airbufo Forspiro on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1, 2, 3, 4 või 6 inhalaatorit, millest igas on 60 annust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

### Müügiloa hoidja ja tootja

#### Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.  
Verovškova 57  
SI-1000 Ljubljana  
Sloveenia

#### Tootjad:

Aeropharm GmbH  
Francois-Mitterrand-allee 1  
07407 Rudolstadt  
Saksamaa

Lek Pharmaceuticals d.d.,  
Verovškova 57  
1526 Ljubljana  
Sloveenia

Salutas Pharma GmbH,  
Otto-von-Guericke-Allee 1  
39179 Barleben

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

tel: + 372 6652400

**Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.**