

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Broncophen Duo, pastillid

aed-liivatee ürdi kuivekstrakt, altee juure kuivekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või tervishoiutöötaja on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti, apteekri või kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Broncophen Duo ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Broncophen Duo võtmist
3. Kuidas Broncophen Duo't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Broncophen Duo't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Broncophen Duo ja milleks seda kasutatakse

Traditsiooniline taimne ravim, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.

Ravimit kasutatakse kurguärrituse ja kaasneva kuiva kõha leevendamiseks ja viskoosse röga eritumise soodustamiseks ülemiste hingamisteede haigustega kaasneva kõha puhul.

Broncophen Duo on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja üle 6-aastastel lastel.

Kui sümptomid halvenevad või püsivad 5 päeva möödumisel, tuleb pidada nõu arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Broncophen Duo võtmist

Broncophen Duo't ei tohi võtta

kui olete aed-liivatee, altee juure või teiste huulõieliste (*Lamiaceae*) sugukonda kuuluvate taimede või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Broncophen Duo võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Hingelduse, palaviku või mädase eritise tekkimisel tuleb pidada nõu arstiga.

Lapsed

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 6-aastastel lastel, sest esineb oht terve pastilli kogemata allaneelamiseks.

Muud ravimid ja Broncophen Duo

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate/kasutate, olete hiljuti võtnud/kasutanud või kavatsete võtta/kasutada mis tahes muid ravimeid. Puuduvad teadaolevad koostoimed teiste ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole seda ravimit raseduse või imetamise ajal soovitatav kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimise või masinatega töötamise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Broncophen Duo sisaldab maltitooli, sorbitooli, propüleenglükooli ja bensüülalkoholi

Broncophen Duo sisaldab 615 mg maltitooli ja 210 mg sorbitooli ühes pastillis. Sorbitool on fruktoosi allikas. Kui arst on teile öelnud, et teie (või teie laps) ei talu teatud suhkruid või teil (või teie lapsel) on diagnoositud pärilik harvaesinev fruktoositalumatus (mistõttu organism ei suuda lagundada fruktoosi), peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab 6,42 mg propüleenglükooli ühes pastillis.

Ravim sisaldab 0,01 mg bensüülalkoholi ühes pastillis.

Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi pastillis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Broncophen Duo't võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud, eakad ja üle 12-aastased noorukid:

2 pastilli iga 3 kuni 4 tunni järel (4 kuni 6 korda ööpäevas, maksimaalne ööpäevane annus on 12 pastilli).

Kasutamine lastel

6...11-aastased lapsed:

1 pastill iga 3 kuni 4 tunni järel (4 kuni 6 korda ööpäevas, maksimaalne ööpäevane annus on 6 pastilli).

Alla 6-aastased lapsed:

Ei ole soovitatav kasutada alla 6-aastastel lastel.

Manustamisviis:

Suukaudne.

Imemiseks, lasta suus lahustuda.

Manustamise kestus:

Kui sümptomid halvenevad või püsivad 5 päeva möödumisel, tuleb pidada nõu arstiga.

Kui te võtate Broncophen Duo't rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud.

Kui te unustate Broncophen Duo't võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aed-liivateed sisaldavate ravimpreparaatide kasutamisega seoses on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest ja seedetrakti häiretest. Esinemissagedus on teadmata.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Broncophen Duo't säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „EXP:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Broncophen Duo sisaldab

Toimeained on:

Üks pastill sisaldab:

51,1 mg ekstrakti (kuivekstraktina), mis on saadud aed-liivatee (*Thymus vulgaris* L. ja *Thymus zygis* L.) ürtidest (7-13:1). Ekstrahent: vesi

4,5 mg ekstrakti (kuivekstraktina), mis on saadud altee (*Althaea officinalis* L.) juurest (7-9:1).

Ekstrahent: vesi

Teised koostisosad on:

Akaatsiakummi, vedel sorbitool (mittekristalliseeruv) (E420), vedel maltitool (E965), maltodekstriin, sidrunhape, naatriumsahhariin, aroonia lõhna- ja maitseaine (propüleenglükool (E1520)), metsamarjade lõhna- ja maitseaine (propüleenglükool (E1520), bensüülalkohol (E1519)), kerge vedel parafiin, puhastatud vesi.

Kuidas Broncophen Duo välja näeb ja pakendi sisu

Broncophen Duo on marjamaitsega pruuni värvi ümmargused pastillid (läbimõõt 19,0 mm, kõrgus 6,5 mm) PVC/PE/PVdC-alumiinium blisterpakendites, milles on 10, 20, 30 või 40 pastilli. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21

1160 Vienna

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2021.